

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah dilaksanakan Asuhan kebidanan pada Ny. N P₁A₀ 22 tahun di PMB Farida Yunita,S.ST Gunung Terang, Kalianda, Lampung Selatan untuk meningkatkan produksi ASI dengan penatalaksanaan pijat oksitosin didapatkan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pengkajian telah dilakukan secara keseluruhan terhadap Ny. N P₁A₀ 22 tahun di PMB Farida Yunita,S.ST dengan pengeluaran ASI sedikit melalui pendekatan manajemen kebidanan Varney dan dituangkan dalam bentuk SOAP.
2. Perumusan diagnosa potensial telah dilakukan pada ibu nifas terhadap Ny. N P₁A₀ 22 tahun di PMB Farida Yunita,S.ST dengan pengeluaran ASI sedikit melalui pendekatan manajemen kebidanan.
3. Telah dilaksanakan Perumusan diagnosa atau masalah potensial yaitu pada Ny. N P₁A₀ 22 tahun di PMB Farida Yunita,S.ST dengan pengeluaran ASI sedikit dengan hasil tidak ada masalah potensial yang terjadi pada Ny. N karena diberikan penanganan yang tepat.
4. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny. N P₁A₀ 22 tahun di PMB Farida Yunita,S.ST dengan hasil bahwa pada kasus ini tidak dilakukan kolaborasi karena tidak adanya indikasi dan data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan tersebut.
5. Rencana asuhan yang dibuat sudah berdasarkan diagnosa kebidanan yang muncul pada Ny. N P₁A₀ di PMB Farida Yunita,S.ST dengan pengeluaran ASI sedikit dengan hasil merencanakan asuhan kebidanan dengan pijat oksitosin untuk meningkatkan pengeluaran ASI.
6. Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rencana asuhan kebidanan yang telah dibuat yaitu pijat oksitosin pada Ny. N P₁A₀ di PMB Farida Yunita,S.ST dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berdasarkan SOP pijat oksitosin.

7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny. N P₁A₀ di PMB Farida Yunita,S.ST dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan telah berhasil ditandai dengan produksi ASI yang bertambah dan pengeluaran menjadi lancar sehingga bayi cukup mendapatkan ASI.
8. Pendokumentasian hasil Asuhan kebidanan telah dilakukan pada ibu nifas terhadap Ny. N P₁A₀ di PMB Farida Yunita,S.ST dalam bentuk SOAP.

B. Saran

Penulis menyadari akan kekurangan dalam laporan kasus ini, adapun saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PMB Farida Yunita

Setelah dilakukan Studi kasus dengan penatalaksanaan pijat oksitosin yang dilakukan 2 kali dalam sehari di pagi dan sore hari untuk meningkatkan pengeluaran ASI pada ibu nifas primigravida dengan ASI sedikit. Oleh karena itu, diharapkan agar dapat diterapkan dan sebagai alternatif pada ibu nifas apabila terdapat masalah seperti hal tersebut.

2. Bagi D III Kebidanan Poltekkes Tanjungkarang

Bagi D III Kebidanan untuk dapat menjadi sumber referensi pencapaian Asuhan kebidanan dengan pijat oksitosin.

3. Bagi Penulis Lainnya

Diharapkan dapat menggali informasi dari sumber terpercaya dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama berlangsungnya Asuhan kebidanan pada sesuai dengan teori atau wewenang kebidanan.