

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Presentase Pasien Dengan Diagnosa ISPA Bagian Atas di Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Sukajaya dalam kategori usia balita (0-5 tahun) yaitu 40% (48 pasien), sedangkan berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah laki-laki yaitu 60.8% (73 pasien).
2. Presentase Kortikosteroid yang diberikan pada Pasien Dengan Diagnosa ISPA Bagian Atas di Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Sukajaya adalah Dexametason yaitu sebesar 84.2% (101 pasien).
3. Presentase dosis Kortikosteroid yang diberikan pada Pasien Dengan Diagnosa ISPA Bagian Atas di Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Sukajaya untuk dosis sekali minum yang tepat yaitu sebesar 33,3% (40 pasien), sedangkan yang tidak tepat yaitu underdose sebesar 66,7% (80 pasien). Dan presentase dosis sehari Kortikosteroid yang diberikan pada Pasien Dengan Diagnosa ISPA Bagian Atas di Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Sukajaya yang tepat yaitu underdose sebesar 33,5% (39 pasien), sedangkan yang tidak tepat sebesar 67,5%.(81 pasien).
4. Gambaran Kortikosteroid yang diberikan pada Pasien Dengan Diagnosa ISPA Bagian Atas di Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Sukajaya seluruhnya sesuai dengan Formularium (100%)

B. Saran

1. Perlunya dibuat formularium puskesmas tidak hanya berdasarkan gejala penyakit namun juga berdasarkan diagnosa medis.
2. Perlunya dilakukan perhitungan dosis secara tepat sehingga kerja obat yang diberikan lebih optimal.