

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan studi pustaka yang telah dilakukan terhadap 10 artikel ilmiah, yang meliputi artikel ilmiah dan tinjauan literatur dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai terendah dari kadar Interleukin-6 (IL-6) pada pasien konfirmasi COVID-19 yaitu berkisar antara 0-34 (pg/L), dengan nilai tengah antara 19,6-121 (pg/L) dan nilai tertinggi antara 76-430 (pg/L).
2. Nilai terendah dari kadar C- Reaktif Protein (CRP) pada pasien konfirmasi COVID-19 yaitu berkisar antara 0-122 (mg/L), dengan nilai tengah antara 12,1-226,2 (mg/L) dan nilai tertinggi antara 27,23-440 (mg/L).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan studi pustaka yang telah dilakukan, penulis memberikan saran:

1. Sebaiknya pemeriksaan kadar C- Reaktif Protein (CRP) dilakukan untuk pasien COVID-19 yang dirawat dirumah sakit sebagai monitoring, evaluasi progres penyakit dan membantu identifikasi awal keparahan penyakit pada pasien COVID-19.
2. Perlu dilakukannya pemberian alat bantu napas atau ventilator pada pasien COVID-19 yang mengalami kegagalan napas, bahkan jika memungkinkan pemberian terapi anti-IL-6 diperlukan guna mengurangi resiko kematian pada pasien COVID-19.