

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan studi pustaka yang telah dilakukan terhadap 14 jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari hasil jurnal dengan kadar rata-ratanya didapatkan peningkatan kadar CRP pada diabetes melitus tipe 1 atau diabetes melitus tipe 2, dengan nilai rata-rata kadar terendah 3,4 mg/L dan nilai rata-rata kadar tertinggi 90,80 mg/L.
2. Berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa kadar CRP pada diabetes melitus tipe 1 atau diabetes melitus tipe 2 lebih meningkat pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
3. Berdasarkan usia dapat disimpulkan bahwa semakin tua usia penderita maka semakin tinggi pula kadar CRP dengan demikian semakin berisiko pula komplikasi diabetes melitus yang terjadi pada penderita.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai gambaran CRP pada penderita diabetes melitus tipe 1 atau diabetes melitus tipe 2 dengan menambahkan faktor pada individu yang mengalami obesitas.