

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan studi pustaka yang telah dilakukan terhadap 15 artikel jurnal penelitian terkait pengaruh obat anti tuberkulosis terhadap kadar hemoglobin penderita tuberkulosis, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan 7 artikel terkait, persentase penderita tuberkulosis yang menjalani pengobatan memiliki kadar hemoglobin rendah sebanyak 43,2% - 76,2% dan yang memiliki kadar hemoglobin normal sebanyak 23,8% - 57%.
2. Berdasarkan lamanya pengobatan dari 10 artikel terkait disimpulkan bahwa kadar hemoglobin dibawah normal lebih banyak terjadi pada bulan ke 2 pengobatan kemudian sedikit meningkat pada bulan ke 3 - ke 6 pengobatan.
3. Berdasarkan 7 jurnal terkait disimpulkan adanya pengaruh obat anti tuberkulosis terhadap kadar hemoglobin dimana adanya perbedaan yang signifikan pada kadar hemoglobin penderita tuberkulosis sebelum dan setelah pengobatan dengan nilai $p < 0,05$ dan $p < 0,01$.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pemantauan dan pemeriksaan kadar hemoglobin secara rutin guna mencegah terjadinya defisiensi besi pada penderita tuberkulosis yang menjalani pengobatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai kadar hemoglobin terhadap penderita tuberkulosis paru yang menjalani pengobatan tetapi dengan menambahkan variabel penelitian seperti berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan. Hal ini guna memperkaya artikel penelitian yang berfokus pada kadar hemoglobin penderita tuberkulosis