# BAB IV

# TINJAUAN KASUS

## STIMULASI PIJAT BAYI UNTUK MEMPERKUAT REFLEKS MENGHISAP PADA NEONATUS Ny.M DI PMB ANNISAK MEISURI S.ST LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

**A. Kunjungan pertama**

Tanggal : 21 Februari 2020

Pukul : 10.00 WIB

**Identitas**

A. Identitas Bayi

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : Bayi Ny.M | |
| Umur | : 6 Hari | |
| Tanggal/Jam Lahir | : 15 Februari 2020 | Jam :13.30 WIB |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Berat Badan Lahir | : 2600 gram | |
| Panjang Badan | : 51 cm | |
| Anak Ke | : 2 (dua) | |
| Usia Kehamilan | : 40 minggu 1 hari | |

B. Identitas Orang Tua

| | Ibu | Ayah |
|---|---|---|
| Nama | : Ny. M | Tn.T |
| Umur | : 32 tahun | 33 tahun |
| Agama | : Islam | Islam |
| Suku/Bangsa | : Sunda/Indonesia | Sunda/Indonesia |
| Pendidikan | : SMA | SMA |
| Pekerjaan | : IRT | Karyawan Swasta |
| Alamat | : Sukajaya Way Lubuk Kec,Kalianda,Kab.Lampung Selatan. | |

**Data Subyektif**

Ibu mengatakan melahirkan bayinya pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 13:30 WIB, jenis kelamin perempuan, berat badan 2600 gram dan panjang badan 51 cm. Ibu mengatakan bayinya tidak menyusu dengan kuat,bayinya rewel dan menyusu hanya sebentar-sebentar sejak kemarin, BAK 5-6 x/hari, BAB 2-3 x/hari.

**Data Objektif**

Keadaan umum baik,bayi menangis kuat,tonus otot baik,nadi 124x/menit, suhu 36.5°C, pernapasan 42x/menit, isapan bayi tidak kuat, bayi menyusu kurang dari 15 menit tiap payudara.

Pemeriksaan fisik :

1.Kepala

Dahi : Normal

Mata : Simetris

Sklera : tidak ikterik

Konjungtiva : merah muda

Bulu Mata : tidak ada entropion dan ekstropion

Mulut : Bibir : lembab,tidak sumbing tidak tampak stomatitis

Lidah : bersih

Langit langit : tidak ada palato

Telinga : Simetris

Hidung : Simetris dan berlubang

Wajah : Kemerahan

2.Leher : Pergerakannya baik,Tidak ada trauma leher

3.Dada : Simetris,Pernafasan dada normal

4.Bahu : Simetris

5.Tangan : Simetris tidak ada polidaktil dan sindaktil, ekstermitas tidak kebiruan, tidak icterus.

6.Abdomen : tidak tampak benjolan abnormal

Tali pusat : belum terlepas,sudah kering

7.Genetalia : Terdapat dua lubang,lubang uretra dan lubang vagina,Labia mayora menutupi labia minora

8. Ekstermitas bawah : Simetris, tidak terdapat polidaktil dan sindaktil, jari- jari tidak kebiruan, tidak icterus

10.Punggung :Tidak ada tanda abnormalitas

11.Anus dan Rectum : Anus berlubang,Mekonium sudah keluar

12.Kulit : Normal,kemerahan,Tidak ada ruam dan tanda tanda infeksi

13.Pemeriksaan penunjang:-

**Analisa Data**

Diagnosa : Bayi Ny.M usia 6 hari lahir cukup bulan

Masalah : Isapan bayi tidak adekuat.

**Penatalaksanaan**

1. Memberitahukan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bayinya yaitu.Keadaan umum baik ,bayi menangis kuat,tonus otot baik,nadi 124x/menit, 36.5 °C, pernapasan 42x/menit.
2. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula
3. Menjelaskan kepada ibu untuk memberikan ASI ekslusif pada bayinya
4. Menjelaskan manfaat serta pentingnya ASI ekslusif untuk kesehatan bayinya salah satunya untuk mempercepat tumbuh kembang bayi dan menjaga daya tahan tubuh bayinya
5. Memberikan solusi kepada ibu dengan cara Mengajarkan ibu pijat bayi serta menjelaskan manfaatnya pijat bayi untuk meningkatkan Stimulus Rangsangan ingin menyusu. (Tatalaksana pijat bayi di lampirkan pada lampiran)
6. Mengajarkan ibu teknik menyusui dengan cara memastikan bayi dapat menyusu dengan benar yaitu dengan cara menghisap puting beserta seluruh areolanya dimasukkan kedalam mulut bayi sehingga bayi menghisap dapat lebih kuat.
7. Memberitahu ibu untuk memastikan bayi cukup ASI ditandai dengan Bayi minum ASI tiap 2-3 jam atau dalam 24 jam minimal mendapatkan ASI 8 kali pada 2-3 minggu pertama, Kotoran berwarna kuning dengan frekuensi sering dan warna menjadi lebih muda pada hari kelima setelah lahir, Bayi akan buang air kecil (BAK) paling tidak 6-8 kali sehari, Ibu dapat mendengarkan pada saat bayi menelan ASI, Payudara terasa lebih lembek yang menandakan ASI telah habis, Warna bayi merah (tidak kuning) dan kulit terasa kenyal, Pertumbuhan berat badan dan tinggi badan bayi sesuai dengan grafik pertumbuhan, Perkembangan motorik baik (bayi aktif dan motoriknya sesuai dengan rentang usianya), Bayi kelihatan puas, sewaktu-waktu saat lapar akan bangun dan tidur dengan cukup, Bayi menyusu dengan kuat (rakus), kemudian mengantuk dan tertidur pulas.

8. Ibu mengerti apa yang telah dijelaskan,tentang tehnik pijat bayi untuk membantu menstimulus bayi agar dapat menyusu secara optimal dengan menggunakan baby oil,2 kali dalam sehari,dilakukan pemijatan sampai usia 2 minggu.tehnik menyusui,memastikan bayi cukup asi.

**B. Catatan Perkembangan I**

Tanggal : 28 Februari 2020

Pukul : 10.30 WIB

**Data Subyektif**

Ibu mengatakan hanya memberikan ASI saja pada bayinya, ibu mengatakan sudah menjaga kehangatan bayinya dan sudah melakukan teknik menyusui dengan benar,ibu juga sudah melakukan pijat bayi dan bayinya merasa nyaman ketika dipijat.Ibu mengatakan bayinya sudah lebih tenang dan tidak rewel lagi dan bayinya sudah menyusu lebih lama dan mengisap lebih kuat dari sebelumnya. Dan hasilnya berat badan bayi sebelum dilakukan pijat bayi yaitu 2600 gram saat setelah dilakukan pijat bayi berat badan bayi bertambah menjadi 3200 gram.

**Data Obyektif**

Keadaan umum baik,bayi menangis kuat,tonus otot baik,nadi 124x/menit, suhu 36.5°C, pernapasan 42x/menit, isapan bayi kuat,Menyusu lebih dari 20 menit tiap payudara sebanyak 8-10 kali sehari.

**Analisa Data**

Diagnosa : Bayi Ny.M usia 2 minggu lahir cukup bulan.

Masalah : -

**Penatalaksanaan**

1. Memberitahukan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bayinya

   N : 126 x/m

   P :42 x/m

   S : 36.7 °C

2. Memastikan kepada ibu apakah bayinya mendapatkan ASI cukup tanpa diberikan pendamping ASI atau susu formula

3. Memastikan kembali kepada ibu tentang teknik menyusui dengan benar yaitu dengan cara menghisap puting beserta seluruh areolanya dimasukkan kedalam mulut bayi.

4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin minimal 2-3 jam sekali atau sesuai keinginan bayi.

5. Memberitahu ibu untuk memastikan bayi cukup ASI ditandai dengan Bayi minum ASI tiap 2-3 jam atau dalam 24 jam minimal mendapatkan ASI 8 kali pada 2-3 minggu pertama, Kotoran berwarna kuning dengan frekuensi sering dan warna menjadi lebih muda pada hari kelima setelah lahir, Bayi akan buang air kecil (BAK) paling tidak 6-8 kali sehari, Ibu dapat mendengarkan pada saat bayi menelan ASI, Payudara terasa lebih lembek yang menandakan ASI telah habis, Warna bayi merah (tidak kuning) dan kulit terasa kenyal, Pertumbuhan berat badan dan tinggi badan bayi sesuai dengan grafik pertumbuhan, Perkembangan motorik baik (bayi aktif dan motoriknya sesuai dengan rentang usianya), Bayi kelihatan puas, sewaktu-waktu saat lapar akan bangun dan tidur dengan cukup, Bayi menyusu dengan kuat (rakus), kemudian mengantuk dan tertidur pulas.

6. Mengingatkan kembali pada ibu untuk menyendawakan bayinya setelah menyusu agar bayi tidak gumoh atau muntah.
7. Melakukan evaluasi pijat bayi terhadap ibu dan dilakukan peningbangan berat badan bayi kembali setelah dilakukan pemijatan hasilnya berat badan bayi bertambah menjadi 3200 gram.