

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan pada beberapa artikel mengenai Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara pada wanita, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara riwayat usia menarche ibu dengan kejadian kanker payudara dengan nilai OR berkisar 3,083 sampai 6,25 (2,33-16,75) dengan $p \text{ value} = 0,000 < 0,05$.
2. Terdapat hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian kanker payudara dengan nilai OR berkisar 3,509 (CI 95% = 1,324-9,295) sampai 18,30 (CI 95% = 3,674-91,229) dengan nilai $p \text{ value} 0,000 < 0,05$.
3. Terdapat hubungan antara riwayat lamanya menyusui dengan kejadian kanker payudara dengan nilai OR berkisar 26,0 (CI 95% = 6,532-103,49) sampai 5,6 dengan nilai $p \text{ value} = 0,000 < 0,05$.
4. Terdapat hubungan antara paparan asap rokok dengan kejadian kanker payudara dengan nilai OR berkisar 1,35-2,579 dengan nilai $p \text{ value} = 0,001 < 0,05$.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai hasil penelitian ini dalam rangka memberikan gambaran umum mengenai usia menarche, riwayat lamanya menyusui, riwayat kanker payudara dan paparan asap rokok yang berhubungan terhadap kejadian kanker payudara adalah sebagai berikut:

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Diharapkan tenaga kesehatan dapat melakukan pendeteksian secara dini dengan pemberian informasi berupa SADARI (periksa payudara sendiri) dalam upaya penanggulangan kanker payudara.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan sumber informasi tentang faktor-faktor penyebab kejadian kanker payudara

3. Bagi Prodi Kebidanan Metro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat sebaik-baiknya bagi mahasiswa prodi kebidanan Metro tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara.