

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TANJUNG KARANG
Laporan Tugas Akhir, Juni 2019

Maya Renzy Meriyanti
1615401075

Teknik Perawatan Luka Perineum Dengan Rebusan Daun Sirih Merah Terhadap NY.A Di PMB Santi Yuniarti,Amd.Keb Lampung Selatan,2019

Xiii+52 halaman, 31 Singkatan,8 tabel,3 Lampiran

ABSTRAK

Puerperium who suffer from perineal wounds cannot be properly discerned and perineal care that cannot properly occur infection in the perineum. Objective treatment of perineal wounds to prevent infection and accelerate healing. Perineal wound care is carried out by the people of Indonesia, one of them by using betel leaf boiled water which has antibiotic effects, in turn in this process the betel can also be used as a material for wound care which is available by means of splashing and soaking.

There were 4 times as many puerperium visits starting from 6-8 hours postpartum to 6 weeks postpartum. After subjective and objective data assessment there was a problem with pain in Perineal Wounds at 6-8 hours postpartum. Treatment Techniques for Perineal Wounds with Decoction of Red Betel Leaves Against NY.A 29 years P2A0 began to be done on the second day postpartum until the tenth day postpartum. Treatment Techniques Betel Leaf Decoction is carried out 1x a day by the mother and there is no sign of infection.

Conclusion: The application of betel leaf decoction techniques can handle perineal wounds to postpartum mothers.

Keywords : Perineal Wounds, Betel Leaves
Reading list : 18 (2004-2018)

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TANJUNG KARANG
Laporan Tugas Akhir, Juni 2019

Maya Renzy Meriyanti
1615401075

Teknik Perawatan Luka Perineum Dengan Rebusan Daun Sirih Merah Terhadap NY.A Di PMB Santi Yuniarti,Amd.Keb Lampung Selatan,2019

Xiii+52 halaman, 31 Singkatan,8 tabel,3 Lampiran

RINGKASAN

Luka perineum apabila tidak dijaga dengan baik dan perawatan perineum yang tidak benar dapat mengakibatkan timbulnya infeksi pada perineum. Perawatan luka perineum bertujuan untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Perawatan luka perineum dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya dengan menggunakan air rebusan daun sirih yang mempunyai efek antibiotik, berdasarkan pada efek terapi ini maka sirih juga bisa dijadikan bahan untuk perawatan luka yang biasanya digunakan dengan cara untuk cebok dan rendam.

Dilakukan kunjungan nifas sebanyak 4 kali mulai dari 6-8 jam postpartum hingga 6 minggu postpartum. Setelah dilakukan pengkajian data subjectif dan objectif terdapat masalah nyeri pada Luka Perineum pada 6-8 jam postpartum . Teknik Perawatan Luka Perineum Dengan Rebusan Daun Sirih Merah Terhadap NY.A 29 tahun P2A0 mulai di lakukan pada hari ke dua postpartum hingga hari ke sepuluh postpartum. Teknik Pengobatan Rebusan Daun Sirih dilakukan 1x sehari oleh ibu dan tidak terdapat tanda infeksi.

Kesimpulan : Penerapan teknik rebusan daun sirih dapat menangani luka perineum terhadap ibu postpartum

Kata kunci : Luka Perineum, Daun Sirih
Daftar Bacaan : 18 (2004-2018)