

PPOLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TANJUNGKARANG
Laporan Tugas Akhir, Juli 2019

Nurul Cahya Pertiwi : 1615401094

Studi Kasus Pada Ibu Bersalin dengan Robekan Perineum Derajat II di PMB
Masnon, SST, M.Kes, Wayhuwi, Lampung Selatan

xiv + 74 halaman, 1 tabel, 8 gambar dan lampiran

RINGKASAN

Salah satu penyebab langsung kematian ibu terutama pada persalinan adalah dengan terjadinya rupture perineum derajat II yang dapat menyebabkan perdarahan, hemtoma,fistula, serta infeksi.Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di PMB Masnon dari bulan Februari - April 2019 masih ditemukan fenomena robekan perineum derajat II,terdapat 20 persalinan spontan pervaginam, 5 ibu (25%) dengan persalinan mengalami robekan perineum derajat 1 ,3 ibu (15%) mengalami robekan perineum derajat II, sedangkan 12 ibu (60%) lainnya tidak mengalami robekan perineum.

Tujuan metode kasus ini adalah mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan rupture perineum derajat II menggunakan asuhan 7 langkah varney dan didokumentasikan dengan SOAP sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan.Jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif, metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah jenis studi kasus

Setelah dilakukan asuhan kebidanan didapatkan hasil robekan perineum derajat II dilakukan heacting perineum derajat II, TTV normal, keadaan umum ibu baik, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, lochea rubra, serta tidak ada tanda-tanda infeksi pada bekas jahitan,

Setelah dilakukan pengkajian, interpretasi data, diagnose potensial, tindakan segera, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada ibu bersalin dengan rupture perineum derajat II tidak terdapat kesenjangan antara teori dan praktek di lapangan.

Kata Kunci : Robekan Perineum Derajat II

Bahan Pustaka : 2009-2019

TANJUNGKARANG HEALTH PPOLITECHNIC
STUDY PROGRAM DIII KEBIDANAN TANJUNGKARANG
Final Project Report, July 2019

Nurul Cahya Pertiwi: 1615401094

Case studies on maternity with second degree perineal tears in PMB Masnon,
SST, M.Kes, Wayhuwi, South Lampung

xiv+ 74 pages, 1 table, 8 images and attachments

ABSTRACT

One of the direct causes of maternal death, especially in labor, is the occurrence of second degree perineal rupture which can cause bleeding, hemtoma, fistula, and infection. The results of preliminary studies conducted at PMB Masnon from February to April 2019 still have second degree perineal tear phenomena , there were 20 vaginal vaginal spontaneous deliveries, 5 mothers (25%) with labor having a first degree perineal tear, 3 mothers (15%) having a second degree perineal tear, while 12 mothers (60%) having no perineal tears.

The purpose of this case method is to be able to carry out midwifery care for maternity with a second degree perineal rupture using varney 7-step care and documented with SOAP in accordance with midwife's competence and authority. Qualitative research with descriptive type, the method used in the final assignment report case

After midwifery care, the second degree perineal tear was performed by healing of the second degree perineum, normal TTV, good general condition of the mother, 2 lower fingers of the central TFU, good uterine contractions, lochea rubra, and no signs of infection in the former suture.

After assesent, interpretation of data, potential diagnoses, immediate action, planning, implementation, and evaluation in maternity with second degree perineal tears there is no gap between theory and practice.

Keywords : Tear Perineum Degree II

Library Material : 2009-2019