

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING  
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TANJUNGPURING  
Laporan Tugas Akhir, Juli 2019

Fitriani: 1615401034

Studi Kasus Pada Ibu Bersalin Ny.H dengan Robekan *Perineum* Derajat II di  
PMB Siti Hajar S.ST Natar, Lampung Selatan

xv + 74 halaman, 1 tabel, 7 gambar dan 5 Lampiran

### RINGKASAN

Perdarahan yang disebabkan robekan jalan lahir merupakan penyebab kedua kematian dalam persalinan yang mengalami robekan perineum dapat mengakibatkan komplikasi seperti perdarahan, *fistula*, *hematoma* dan infeksi. Angka kejadian Robekan yang ada di PMB Siti Hajar S.ST, dari bulan Februari - April 2019 terdapat 52 persalinan pervaginam, 16 ibu (30,7%) dengan persalinan mengalami robekan *perineum* derajat I, 28 ibu (53,8%) mengalami Robekan *Perineum* Derajat II karena data terbanyak pada ibu primipara, sedangkan 8 ibu (15,3%) lainnya tidak mengalami Robekan *Perineum*.

Tujuan studi kasus ini adalah mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin terhadap robekan *perineum* derajat II dengan menggunakan manajemen asuhan 7 langkah varney yang didokumentasikan dalam bentuk SOAP. Metode Studi kasus ini dengan jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif, metode yang di gunakan studi kasus dalam bentuk SOAP.

Hasil Studi Kasus menunjukkan bahwa setelah dilakukan asuhan kebidanan persalinan pada *primipara* didapatkan hasil robekan *perineum* derajat II, robekan yang terjadi saat kepala bayi lahir karena ketidakmampuan otot *perineum* untuk mengakomodasikan kepala bayi saat lahir dan ketidak elastisnya *perineum*. Robekan telah dilakukan penjahitan *perineum* derajat II dengan menggunakan teknik jelujur, tanda-tanda vital normal, keadaan umum ibu baik, tinggi fundus uteri 2 jari bawah pusat, lochea rubra, serta tidak ada tanda-tanda infeksi pada jahitan.

Kesimpulan dari kasus ini robekan *perineum* telah dilakukan penjahitan secara rapih menggunakan teknik jelujur. Saran memberikan pelayanan pada ibu bersalin robekan *perineum* derajat II dengan tetap memberikan perawatan luka jahitan *perineum* sengan prinsip bersih dan kering.

**Kata kunci :** Persalinan Normal, Robekan *Perinium* Derajat II

**Daftar Bacaan :** 2009-2019

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR  
PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN TANJUNGPUR  
Final Project Report, July 2019

Fitriani: 1615401034

Case Studies of Maternity to Mrs.H with a Second Degree Perineal at PMB Siti Hajar S.ST Natar, South of Lampung

xv + 74 pages, 1 table, 7 images and 5 Attachments

### **ABSTRACT**

Bleeding caused by a birth canal tear is the second leading cause of death in labor that experiences perineal tears which can lead to complications such as bleeding, fistula, hematoma and infection. The incidence of rips in PMB Siti Hajar SST, from February to April 2019, there were 52 vaginal deliveries, 16 mothers (30.7%) with labor having a degree of perineal tear in the first degree, 28 mothers (53.8%) experiencing a Perineum Degree tear II because of the most data in primiparous mothers, while the other 8 mothers (15.3%) did not experience perineal tears.

The purpose of this case study is to be able to carry out midwifery care for maternal births to second-degree perineum tears using varney 7-step care management documented in the form of SOAP. Method This case study is descriptive qualitative research, the method used in the case study is SOAP.

The results of the Case Study show that after delivery of midwifery care in primiparas, a second degree perineal tear is found, a tear that occurs when the baby's head is born due to the inability of the perineal muscle to accommodate the baby's head at birth and the perineum's inelasticity. Tearing has been carried out by suturing the perineum of the second degree using a running technique, normal vital signs, a good general condition of the mother, a high fundus of the uterus 2 fingers down the center, lochea rubra, and no signs of infection in the suture.

The conclusion of this case is that the perineal tear has been neatly sewn using a baste technique. Suggestion for providing services for second-degree perineal tear mothers while providing care for perineal suture with the principle of being clean and dry.

Keywords: Normal Labor, Tear Perineum Degree II  
Reading List: 2009-2019