

**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN  
JURUSAN KEPERAWATAN PROGRAM STUDI D IV KEPERAWATAN**  
Skripsi, Juli 2022

Yosica Bramita

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KECEMASAN  
PASIEN PRE OPERASI *SEKSIO SESAREA* DI RUMAH SAKIT UMUM  
HANDAYANI KOTABUMI TAHUN 2022**

(xvi + 46 halaman, 3 gambar, 8 tabel, 8 lampiran)

**ABSTRAK**

Kasus rata-rata *seksio sesarea* di dunia sekitar 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. Di Indonesia angka kejadian *seksio sesarea* mengalami peningkatan, yaitu 80% metode persalinan dengan *seksio sesarea* dengan rata-rata 17,6% kasus *seksio sesarea* dari 78.736 kelahiran. Di provinsi Lampung tahun 2018 kasus *seksio sesarea* sekitar 13,2% dari 2.644 kelahiran. Di Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi tahun 2020 *seksio sesarea* sebanyak 518 orang dari total 712 persalinan atau sebesar (72,7%). Kecemasan dapat dialami oleh ibu pre *seksio sesarea* karena tindakan pembedahan merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi *seksio sesarea* di Rumah Sakit Umum Handayani Kotabumi. Jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan *survey analitik* dan pendekatan *cross sectional*. Teknik sampling menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel sebanyak 33 responden. Waktu penelitian pada 6 Juni- 25 Juni 2022. Uji statistik menggunakan uji *Chi-Square*.

Hasil penelitian didapatkan mayoritas responden mengalami kecemasan sedang sebanyak (57,6%). Hasil uji statistik diperoleh pada usia  $p\text{-value} (0,011) < \alpha (0,05)$ , pendidikan  $p\text{-value} (0,001) < \alpha (0,05)$ , paritas  $p\text{-value} (0,002) < \alpha (0,05)$ , dan dukungan suami  $p\text{-value} (0,004) < \alpha (0,05)$ . Hal ini dapat disimpulkan ada hubungan antara usia, pendidikan, paritas, dukungan suami dengan kecemasan pasien pre operasi *seksio sesarea*. Peneliti berharap agar faktor faktor yang berhubungan dengan kecemasan pasien pre operasi *seksio sesarea* dapat diperhatikan supaya tidak terjadi berbagai macam komplikasi selama periode perioperatif.

Kata Kunci : Faktor-faktor, kecemasan, *seksio sesarea*

Bahan Pustaka : 30 (2010-2021)

Yosica Bramita

**FACTORS RELATED TO ANXIETY OF PRE SECTIO CAESAREA PATIENTS AT HANDAYANI GENERAL HOSPITAL, KOTABUMI IN 2022**

(xvi + 46 pages, 3 pictures, 8 tables, 8 attachments)

**ABSTRACT**

Average case *cesarean section* in this world about 5-15%, 1000 births in the world. In Indonesia, the incidence of cesarean section has increased, namely 80% of methods of delivery with *cesarean section* with an average of 17.6% cases *cesarean section* of 78,736 births. In Lampung province in 2018 cases of *cesarean section* about 13.2% of the 2,644 births. At the Handayani General Hospital, Kotabumi in 2020, *cesarean sections* were 518 people out of a total of 712 deliveries or 72.7%. Anxiety can be experienced by pre-*cesarean* mothers because surgery is a potential or actual threat to a person's integrity that can evoke physiological and psychological stress reactions.

This study aims to determine the factors associated with the level of anxiety in patients with preoperative *cesarean section* at the Handayani General Hospital, Kotabumi. This type of research quantitative with *analytic survey* design and *cross sectional* approach. The sampling technique used *purposive sampling* technique, a sample of 33 respondents. The research time is on June 4 - June 25, 2022. The analysis test in this study uses the *Chi-Square* test.

The results showed that the majority of respondents experienced moderate anxiety (57.6%). Statistical test results obtained at age *p-value* (0,011) <  $\alpha$  (0,05), education *p-value* (0,001) <  $\alpha$  (0,05), parity *p-value* (0,002) <  $\alpha$  (0,05), and husband's support *p-value* (0,004) <  $\alpha$  (0,05). It can be concluded that there is a relationship between age, education, parity, husband's support and anxiety in patients with preoperative *cesarean section*. Researchers hope that the factors related to the anxiety of preoperative *cesarean section* patients are still considered so that there are no complications during the perioperative period.

Keywords : Factors, anxiety, *cesarean section*

Reference List : 30 (2010-2021)