

**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR**  
**JURUSAN KEPERAWATAN**  
**PROGRAM STUDI PROFESI NERS**  
**Laporan Tugas Akhir Ners, April 2022**

Fadilla Yuwantri

**ASUHAN KEPERAWATAN PERIOPERATIF**  
**PASIHEN DENGAN DIAGNOSA *LIMFADENOPATI AXILA SINISTRA***  
**PADA Nn.D DI RUANG OPERASI RUMAH SAKIT MARDI WALUYO**  
**METRO TAHUN 2022**  
**xviii + 62 halaman, 16 tabel, 3 gambar, 14 lampiran**

**ABSTRAK**

*Limfadenopati* adalah kelainan dari KGB dalam bentuk ukuran, jumlah, konsistensi, yang disebabkan penambahan sel-sel pertahanan tubuh yang berasal dari KGB itu sendiri (limfosit, sel plasma, dll), adanya infiltrasi sel peradangan (neutrofil), atau adanya infiltrasi sel ganas. *Limfadenopati* secara umum adalah pembesaran yang terjadi pada lebih dari dua kelompok kelenjar getah bening yang tidak berdekatan. Kelenjar getah bening (lymphonode atau nodus limfatik) berisi sel darah putih dan memiliki peran penting dalam kemampuan tubuh untuk melawan virus, bakteri dan penyebab lainnya. *Limfadenopati* biasanya dirasakan dibawa dagu, dileher, ketiak, atau dipangkal paha. Tujuan dari laporan ini yaitu menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan perioperatif dengan tindakan eksisi atas indikasi limfadenopati.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara serta pendokumentasian yang dilaksanakan pada tanggal 19 april -20 april 2022. Subyek pada asuhan keperawatan ini berfokus pada satu pasien dengan diagnosa medis *Limfadenopati* yang dilakukan tindakan eksisi di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro.

Berdasarkan hasil analisis data terdapat 4 diagnosa keperawatan yang ditegakan, fase preoperatif: nyeri akut dan ansietas, intraoperatif: resiko cedera dan pada fase postoperatif : nyeri akut perioperatif, nyeri akut. Perencanaan keperawatan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ditegakan serta implementasi keperawatan berfokus pada tindakan observasi, terapeutik, edukasi serta kolaborasi dengan tim operasi. Evaluasi dari tindakan keperawatan yaitu, nyeri akut dan ansietas teratasi pada tahap preoperatif, resiko cedera perioperatif tidak terjadi pada fase intraoperatif dan pada fase postoperatif nyeri akut teratasi. Penulis menyarankan agar perawat dapat melakukan asuhan keperawatan perioperatif sesuai dengan tahapan pada fase preoperatif, intraoperatif serta postoperatif terutama pada kasus *limfadenopati* dengan tindakan eksisi.

Kata Kunci: Eksisi, *Limfadenopati*, Asuhan Keperawatan Perioperatif  
Perioperatif Referensi: 26 (2014-2021)

**TANJUNGPURUS HEALTH POLYTECHNIC  
MAJORING IN NURSING  
NERS PROFESSIONAL STUDY PROGRAM  
Final Report, April 2022**

Fadilla Yuwantri

**PERIOPERATIVE NURSING CARE  
PATIENTS DIAGNOSED WITH AXILA SINISTRA  
LYMPHADENOPATHY ON Ms.D IN THE OPERATING ROOM OF  
MARDI WALUYO METRO HOSPITAL IN 2022  
xviii + 62 pages, 16 tables, 3 figures, 14 appendices**

**ABSTRACT**

Lymphadenopathy is a disorder of the KGB in the form of measuring an amount, consistency, which is due to the addition of body defense cells derived from the KGB itself (lymphocytes, plasma cells, etc.), the presence of infiltration of inflammatory cells (neutrophils), or the presence of infiltration of malignant cells. Lymphadenopathy in general is an enlargement that occurs in more than two groups of nonadjacent lymph nodes. Lymph nodes (lymph nodes or lymphatic nodes) contain white blood cells and have an important role in the body's ability to resist viruses, bacteria and other conservants. Lymphadenopathy is usually felt by the chin, neck, armpits, or thigh base. The purpose of this report is to describe the implementation of perioperative nursing care with excision measures indicative of lymphadenopathy.

The methods used in data collection were observation, interviews and documentation which were carried out on April 19 -20 April 2022. The subject of this nursing care focused on one patient with a medical diagnosis of Lymphadenopathy who underwent excision at the Mardi Waluyo Metro Hospital.

Based on the results of data analysis, there are 4 nursing diagnoses that are established, preoperative phase: acute pain and anxiety, intraoperative: risk of injury and in the postoperative phase: perioperative acute pain, acute pain. Nursing planning is tailored to the nursing issues addressed and nursing implementation focuses on observational, therapeutic, educational and collaborative actions with the operations team. Evaluation of nursing measures, namely, acute pain and anxiety are resolved in the preoperative stage, the risk of perioperative injury does not occur in the intraoperative phase and in the postoperative phase acute pain is resolved. The author suggests that nurses can perform perioperative nursing care according to the stages in the preoperative, intraoperative and postoperative phases, especially in cases of lymphadenopathy with excision procedures .

Keywords: Excision, Lymphadenopathy, Perioperative Nursing Care  
Perioperative Reference: 26 (2014-2021)