

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil 16 analisis terdapat 4 jurnal analisis dari jurnal nasional , 9 jurnal internasional dan 3 analisis dari buku terhadap beberapa jurnal yang telah di lakukan review dan ditemukan selama melakukan review maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ada kecenderungan yang paling banyak antara hubungan skor sinclair lebih dengan nausea post operative (PONV).
2. Ada hasil yang menyimpulkan bahwa skor sinclair tidak efektif untuk memprediksi terjadinya mual post operatif (PONV).
3. Ada kecenderungan yang paling banyak hubungan skor sinclair dengan diagnosa keperawatan nausea pada post operatif (PONV).

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Bagi rumah sakit diharapkan dapat melakukan skor sinclair dengan diagnose keperawatan nausea pada pasien *post* operasi dengan general anestesi di ruang bedah dewasa. Khususnya untuk ruangan bedah dewasa untuk mengurangi terjadinya PONV dikarenakan belum ada yang menggunakan sistem skor pada pasien dengan diagnosa nausea, dengan memperhatikan faktor resiko sebagai prediksi terjadinya PONV serta diaplikasikan sehari – hari di ruang bedah dewasa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil literatur review ini direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan judul hubungan skor sinclair dengan diagnosa keperawatan nausea pada pasien post operasi dengan general anestesi di ruang bedah dewasa. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel dependen seperti mobilisasi pasien *post* operasi atau intek pasien *post* operasi.