

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung tentang perbedaan kadar CK-MB sebelum dan sesudah pemberian trombolitik pada pasien Infark Miokard sebagai berikut:

1. Rata-rata kadar CK-MB sebelum trombolitik pada pasien Infark Miokard 124,5 U/L dengan nilai terendah 11 U/L dan nilai tertinggi 811 U/L.
2. Rata-rata kadar CK-MB setelah trombolitik pada pasien Infark Miokard 253,4 U/L dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 1520 U/L.
3. Terdapat perbedaan yang bermakna antara hasil kadar CK-MB sebelum dan sesudah pemberian trombolitik nilai *p-value* sebesar 0.000 (*p value* <0.05).

B. Saran

1. Pemeriksaan Kadar CK-MB sesudah pemberian trombolitik idealnya dilakukan 3 jam atau kurang dari 24 jam setelah trombolitik agar dapat mengetahui keberhasilan trombolitik dan dilakukan pemeriksaan ulang 24-48 jam setelah trombolitik untuk mengetahui penurunan kadar CK-MB
2. Penelitian selanjutnya untuk memperhatikan waktu pengambilan sampel setelah pemberian trombolitik.