

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) pada kontak serumah penderita tuberkulosis di Kabupaten Mesuji tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mayoritas responden pada penelitian ini berusia produktif sebanyak 69 responden (70,4%), berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 responden (57,1%), berpendidikan rendah sebanyak 64 responden (65,3%), memiliki tingkat pengetahuan baik sebanyak 65 responden (66,3%), sikap yang baik sebanyak 63 reponden (64,3%) dan motivasi yang baik sebanyak 50 responden (51%) serta akses menuju Puskesmas yang sulit sebanyak 51 responden (52%) dan tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari tenaga kesehatan sebanyak 52 responden (53,1%).
2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara usia ($p\ value = 0,077$) dan jenis kelamin ($p\ value = 0,307$) dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji, tetapi ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji dengan nilai $p\ value$ 0,033, dan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 2,815 (CI 95% = 1,172-6,758).
3. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji dengan nilai $p\ value < 0,001$, dan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 5,339 (CI 95% = 2,081-13,696).
4. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji dengan nilai $p\ value < 0,001$ ($p < \alpha$ 0,05), dan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 10,392 (CI 95% = 3,722-29,012).
5. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji dengan nilai $p\ value < 0,001$ ($p < \alpha$ 0,05), dan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 13,473 (CI 95% = 5,128-35,395).

6. Ada hubungan yang signifikan antara akses menuju puskesmas dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji dengan nilai *p value* 0,001 ($p < \alpha$ 0,05), dan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 4,267 (CI 95% = 1,832-9,939).
7. Ada hubungan yang signifikan antara penyuluhan dari tenaga kesehatan dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji dengan nilai *p value* $< 0,001$ ($p < \alpha$ 0,05), dan nilai *Odds Ratio* (OR) sebesar 6,989 (CI 95% = 2,869-17,028).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan:

1. Petugas Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji perlu mengoptimalkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang penyakit TB khususnya program pencegahan penularan dalam hal ini TPT, dengan menggunakan media peraga yang menarik seperti poster, leaflet atau video edukasi singkat, selain itu penyuluhan dilakukan tidak hanya kepada kontak serumah penderita TB tetapi juga kepada pihak-pihak terkait seperti aparat desa, kader kesehatan terutama kader TB dan masyarakat umum.
2. Petugas Puskesmas perlu melakukan evaluasi kepatuhan dan keberhasilan pengobatan TPT.
3. Penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan TPT di Kabupaten Mesuji seperti efek samping obat dan dukungan sosial, serta evaluasi kepatuhan dan keberhasilan pengobatan TPT di Kabupaten Mesuji.