

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat izin penelitian



**Kementerian Kesehatan**  
Poltekkes Tanjungkarang

Jalan Soekarno Hatta No.6 Bandar Lampung  
Lampung 35145  
(0721) 783852  
<https://poltekkes-tjk.ac.id>

Nomor : PP.03.04/F.XLIII/ 198 /2024  
Lampiran : 1 eks  
Hal : Izin Penelitian

7 Maret 2024

Yth, Direktur RS.Advent Bandar Lampung  
Di- Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	Arinda Raudatul Aisyi NIM: 2148401041	Gambaran Penggunaan Analgesik pada Pasien Fraktur di Poli Bedah Orthopedi dan Traumatik di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Tahun 2023	RS. Advent Bandar Lampung

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An.Direktur  
Wakil Direktur I,






**Ns.Martini Fairus,S.Kep, M.Sc**  
NIP: 197068021990032002

Tembusan:  
1.Ka.Jurusan Farmasi  
2.Ka.Bid.Diklat


Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.



## Lampiran 2. Surat kelaikan etik Rumah Sakit Advent Bandar Lampung

	<b>Rumah Sakit Advent Bandar Lampung</b> <b>Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)</b>
<hr/> <small>Jl. Teuku Umar No. 48, Bandar Lampung 35148, Telp. 081366396618</small> <hr/>	
<b>SURAT KELAIKAN ETIK</b> <b>(ETHICAL CLEARANCE)</b>	
Nomor : 017/KEPK- RSABL/ IV/2024	
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT ADVENT BANDARALAMPUNG SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN DENGAN MENYATAKAN BAHWA PENELITIAN DENGAN :	
JUDUL	: "Gambaran Penggunaan Analgesik Pada Pasien Fraktur Di Poli Bedah Orthopedi Dan Traumatik tahun 2023 Pada Rumah Sakit Advent Bandar Lampung"
Peneliti	: Arinda Raudatul Aisyi
NPM	: 2148401041
INSTITUSI	: Poltekes Kemenkes Tanjung Karang Program DIII Farmasi
LOKASI	: RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG
<b>DINYATAKAN LAIK ETIK</b>	
Bandar Lampung, 17 April 2024	
Ketua KEPK RSABL	
 Renny Sarah Asih Nabssah, Ners., M. Kep.	
	
Catatan :	
Keterangan Laik etik ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.	
Pada akhir Penelitian, Laporan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dalam bentuk soft copy. Jika ada perubahan protokol atau perpanjangan Penelitian harus mengajukan kembali permohonan Kajian etik Penelitian.	

## Lampiran 3. Surat keterangan telah menyelesaikan penelitian

 **Rumah Sakit Advent Bandar Lampung**  
**Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)**  
Jl. Teuku Umar No. 48, Bandar Lampung 35148, Telp. 081366396618

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 009 /KEP- RSABL/ III / 2024

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG  
SETELAH MEMANTAU DENGAN SEKSAMA PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN,  
MENYATAKAN BAHWA PENELITIAN DENGAN :

JUDUL : "Gambaran Penggunaan Analgesik Pada Pasien Fraktur Di Poli Bedah Orthopedi  
Dan Traumatik tahun 2023 Pada Rumah Sakit Advent Bandar Lampung"

NAMA : Arinda Raudatul Aisyi

NPM : 2148401041

INSTITUSI : Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang Program D3 Farmasi



LOKASI : Instalasi Rekam Medik RS Advent Bandar Lampung

WAKTU : 17 April – 15 Mei 2024

**DINYATAKAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN**

Bandar Lampung, 16 Mei 2024

Ketua KEPK-RS

Ns. Renny Sara Asih Nababati, S.Kep.,M.KeP

Catatan :

Pada akhir Penelitian, Laporan Pelaksanaan harus diserahkan kepada Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dalam bentuk soft copy.




## Lampiran 4. Lembar konsultasi pembimbing utama

## LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Arinda Raudatul Aisyi

NIM : 2148401041

DOSEN PEMBIMBING : Isnenia, M.sc, Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	Selasa, 5 September 2023	Konsultasi mengenai judul "Gambaran Swemedi nyeri pada masyarakat Srimulyo 2 Lampung selatan"	Revisi judul "Gambaran pola persepsi penggunaan antinyeri pada pasien fraktur di poli bedah Rumah sakit umum daerah pesawaran"	K	
2.	Rabu, 27 September 2023	Konsultasi judul "Gambaran pola persepsi penggunaan antinyeri pada pasien fraktur di poli bedah Rumah sakit umum Daerah pesawaran"	Revisi: - Tempat penelitian - Spesifikasi poli bedah.	B	
3.	Selasa, 17 Oktober 2023	Konsultasi judul "Gambaran penggunaan analgesik pada pasien fraktur di poli bedah ortopedi dan trauma tik pada Rumah sakit Advent Bandar Lampung"	Acc judul LTA	B	

4.	Jumat, 1 Desember 2023	Konsultasi bab I, ii, iii	Revisi Bab I : - di persingkat pada bagian latar belakang - Perbaiki rumusan masalah, - Perbaiki tujuan Revisi Bab ii : - Perbaiki definisi operasional - Revisi Bab iii - Perbaiki pengumpulan sampel - perbaiki kriteria inklusi dan eksklusi	K	<del>AAA</del>
5.	Senin, 11 Desember 2023	Konsultasi bab I, ii, iii	Revisi Bab I : - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki tujuan - Perbaiki ruang lingkup Revisi Bab ii : - di persingkat - tinjauan teori - Perbaiki definisi operasional Revisi bab iii : - perbaiki cara pengumpulan sampel.	K	<del>AAA</del>

6.	Senin, 18 Desember 2023	Konsultasi Bab I, II, III	Revisi bab I: - Perbaiki latar belakang - Perbaiki tujuan Revisi bab II: - Perbaikan Definisi Operasional Revisi bab III: - Perbaiki rentang Penelitian	K	<del>Handwritten signature</del>
7.	Rabu, 20 Desember 2023		leluhur papard Acc Sem. proposal	K	<del>Handwritten signature</del>
8.	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi data mentah	- ditambahkan data obat penyerta - dipisah antara Pasien umum dan BPJS	K	<del>Handwritten signature</del>
9.	Selasa, 4 Juni 2024	Konsultasi data mentah	- data diolah dan dilakukan pengkodean	K	<del>Handwritten signature</del>
10.	Kamis, 27 Juni 2024	Dibimbing Bab 4	- Perbaikan tabel - pengjabaran dll pada tabel - penambahan bentuk sediaan untuk racikan	H	<del>Handwritten signature</del>









11.	Senin, 1 Juli 2024	Bimbingan bab 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki range / rentang usia</li> <li>- Perbaiki Spasi</li> <li>- Perbaiki tabel penyesuaian dosis yg diberikan</li> <li>- Penambahan Pembahasan jenis kelamin</li> </ul>	R	<del>Hand</del>
12.	Rabu, 4 Juli 2024		Acc. Sem. hasil	R	
13.	Kamis, 11 Juni 2024	Revisi cetakan seminar hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki lampiran (usia)</li> <li>- Perbaiki tabel Fraktur</li> <li>- Perbaiki tabel pada jenis analgesik</li> <li>- Perbaiki saran</li> </ul>	R	<del>Hand</del>
14.	Senin, 15 Juli 2024	Revisi setelah seminar hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki tabel (tabel khaman-kini)</li> <li>- Perbaiki saran</li> <li>- Perbaiki total tabel penyesuaian</li> <li>- Perbaiki tabel lampiran</li> </ul>	R	<del>Hand</del>
15.	Kamis, 18 Juli 2024		Acc cetakan	R	







## Lampiran 5. Lembar konsultasi pembimbing pendamping

## LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Arinda Raudatul Aisyi  
 NIM : 2148401041  
 DOSEN PEMBIMBING : dr. Dwi May Indriyani, M.Si

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	4 Juli 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki pada daftar tabel, daftar isi, daftar gambar</li> <li>- revisi bab 1, 2, 4, 5</li> <li>- spasi penulisan</li> </ul>	- Revisi		
2.	30 Juli 2024	- Bimbingan laporan tugas akhir setelah seminar hasil	- Perbaiki penulisan LTA		
3.	12 Agustus 2024	- Bimbingan laporan tugas akhir setelah seminar hasil	- Perbaiki penulisan LTA		
4.	20 Agustus 2024	Bimbingan laporan tugas akhir setelah seminar hasil	perbaiki penulisan LTA		

5.	26 Agustus 2021	Bimbingan Laporan Tugas Akhir setelah seminar hasil	Perbaiki dan Penulisan LTA		
6.	02 September 2021	Bimbingan Laporan Tugas Akhir setelah seminar hasil	Perbaiki dan penulisan LTA - Acc		

Lampiran 6. Lembar perbaikan seminar proposal

**LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Hari / Tanggal : Jumat, 19 Januari 2024  
 Nama Mahasiswa : Arinda Baudatu Arsyi  
 Judul Proposal Tugas Akhir : Gambaran penggunaan analgesik pada Pasien Fraktur di Poli Bedah Ortopedi dan Traumatik di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung

**HASIL MASUKAN :**

Penguji 1 :  
 1. Paragraf 1, 2 → kalimat SPOR 2) hal 3. 3) kata<sup>3</sup> seperti presenter 4) literatur → sumber → sumber  
 5) Penelitian terkait fraktur 6) tujuan → apakah fraktur dari sediaan farmasi 7) tujuan pemb. B) apakah indikator WHO 1533 dilihat 2) kerangka teor 10) hal 14 11) jenis fraktur 12) P.O 13) 13.7.27 14) Lampiran 2

**Penguji 3 :**

1. List analgesik

Mengetahui

Penguji 1, Rani 1 21/2/2024  
 Makhdaletia S. Farm. M. Farm., Apt  
 Penguji 2, dr. Dwi May Indriyani, M.si  
 Penguji 3, Ismenia M.sc., Apt 19/1-2024

Lampiran 7. Lembar perbaikan seminar hasil

**LEMBAR PERBAIKAN  
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR**

Hari / Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024  
 Nama Mahasiswa : Arinda Raudatul Aisyi  
 Judul Tugas Akhir : Campuran penggunaan analgesik pada pasien fraktur di pas bedah ortopedi dan trauma pada Rumah Sakit Advent Bandar Lampung

**HASIL MASUKAN :**

**Penguji 1 :**

- 1) Melalui analgesik opioid, non- opioid, NSAID selektif & non selektif → BAB II.
  - 2) Karies pulsur → JK data A) penyebab fraktur → bisa ditambahkan 5. Tabel 4. 6 x 4.9
  - 3) Perempun banyak hah di range 56-65 ?? → tambah
  - 6) Kombinasi → opioid - opioid, opioid - n. opioid, dist → 7) Lampiran
  - penyusunan donas → pergelis donas 8. 4.6 x 4.15 → 9
  - lumen donas → 10 Kesimpulan → ditulis tertera & terbelah
11. Saran




**Penguji 2 :**

1. penulisan
2. penempatan tanda baca

**Penguji 3 :**

Tabel lengkap  
 Metak → Samply

**Mengetahui**

Penguji 1,  Mawdateng, S.Farm, M.Farm, Apt	Penguji 2  dr. Dwi May Indriyani, N.si	Penguji 3,  Ksatria, M.Sc., Apt
---	---	--

Lampiran 8. Lembar pengumpulan data penelitian kunjungan pertama

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
1	An. R	7 tahun	L	14/07/ 2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1) antibiotik	10	Tablet	3x1/2 sesudah makan
						Cefadroxil 500 mg		10	Capsul	2x1 sesudah makan
2	An. Y	8 tahun	L	25/09/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	20	Capsul	2x1 sebelum makan
3	An. M	12 tahun	L	14/11/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	3x1/2 sesudah makan
4	An. K	13 tahun	L	30/11/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	10	Capsul	2x1 sebelum makan
5	An. K	13 tahun	L	28/12/2023	Fraktur <i>of coccyx</i>	Eterocoxib 60 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
6	An. M	14 tahun	P	19/12/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1/2 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Cefadroxil 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	2x1 sesudah makan
7	An. M	15 tahun	L	7/12/2023	Fraktur of shaft of ulna	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
8	An. F	16 tahun	L	17/10/2023	Fraktur of metatarsal bone	Tramadol 50 mg	OPIOID	10	Capsul	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	10	Tablet	1x1 sesudah makan
9	Tn. A	20 tahun	L	7/02/2023	Fraktur of metatarsal bone	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
10	Tn. R	20 tahun	L	22/08/2023	Fraktur of shaft of radius	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
11	Tn. M	22 tahun	L	9/08/2023	Fraktur of shaft of radius	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Oscal 0,5 mg	Suplemen	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitmain	30	Tablet	1x1 sesudah makan
12	Tn. Y	23 tahun	L	20/10/2023	Fraktur of patella	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
13	Ny. D	24 tahun	P	15/05/2023	Fraktur of other toe	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
14	Tn. Y	25 tahun	L	09/06/2023	Fraktur of clavicle	Tramadol 50 mg	OPIOID	15	Capsul	3x1 sesudah makan
						Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	2x1 sesudah makan dihabiskan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
15	Tn. Y	25 tahun	L	7 /07/2023	Fraktur of upper end of ulna	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
16	Tn. U	27 tahun	L	14/02/2023	Fraktur of patella	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Relaxon 50 mg	Relaksan otot	4	Tablet	2x1 sesudah makan
17	Tn. D	27 tahun	L	3/07/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
18	Ny. Z	27 tahun	P	3/08/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
19	Tn. F	29 tahun	L	14/03/2023	Fraktur <i>of thoracic vertebrata</i>	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID+OPIOID	10	Racikan capsul	1x1 sesudah makan dibuat kapsul
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
20	Ny. P	29 tahun	P	23/11/2023	Fraktur <i>tibia fibula</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
21	Ny. W	29 tahun	P	27/07/ 2023	Fraktur <i>of rib</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
22	Tn. E	29 tahun	L	25/07/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Dexamethasone 0,5 mg	Antiperadangan	6	Tablet	2x1 sesudah makan
23	Tn. A	29 tahun	L	5/12/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Tramadol 50 mg	Opioid	15	Capsul	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
24	Tn. A	30 tahun	L	10/04/2023	Fraktur <i>of shaft of ulna</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
25	Ny. S	31 tahun	P	16/01/2023	Fraktur <i>of other parts of forearm</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
26	Tn. R	31 tahun	L	22/05/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Tramadol 50 mg	OPIOID	20	Capsul	3x1 sesudah makan
27	Tn. K	31 tahun	L	17/11/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makann
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
28	Tn. G	32 tahun	L	9/03/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Tramadol 50 mg	Opiod	15	Capsul	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
29	Tn. R	34 tahun	L	02/05/2023	Fraktur <i>of lower end of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
30	Ny. I	35 tahun	P	21/03/2023	Fraktur <i>Of metatarsal bone</i>	Tramadol 50 mg	OPIOID	15	Capsul	3x1 sesudah makan
						Calcitriol 0,5 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makn

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
31	Tn. F	35 tahun	L	19/10/2023	Fraktur of <i>calcaneus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
32	Tn. E	35 tahun	L	13/04/2023	Frakutr of <i>lateral malleolus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
33	Tn. K	36 tahun	L	4/05/2023	Frakur of <i>lower end of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
34	Tn. S	40 tahun	L	24/11/2023	Fraktur of <i>upper end of ulna</i>	Tramadol 50 mg	OPIOID	10	Capsul	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
35	Ny. M	40 tahun	P	10/04/2023	Fraktur of <i>upper end of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg (kettese)	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Metilprednisolon 4 mg	Antiperadangan	10	Tablet	3x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
36	Ny. R	41 tahun	P	15/06/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
37	Ny. M	42 tahun	P	7/08/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Tramadol 50 mg	Opioid	15	Capsul	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	7	Tablet	1x1 sesudah makan
38	Tn. D	42 tahun	L	20/03/2023	Fraktur <i>of calcaneus</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Vitamin b complex	Vitamin	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Cefadroxil 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	3x1 sesudah makan
39	Ny. L	43 tahun	P	24/10/2023	Fraktur <i>of illium</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
40	Ny. E	43 tahun	P	19/05/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
41	Tn. N	44 tahun	L	12/12/2023	Fraktur <i>of femur</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	15	Tablet	1x1 sesudah makan
42	Tn. E	45 tahun	L	15/08/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ibuprofen 400 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Cefadroxil 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	2x1 sesudah makan, dihabiskan
43	Tn. J	46 tahun	L	29/09/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x 1 sesudah makan
44	Tn. M	46 tahun	L	15/12/2023	Fraktur <i>of shaft of humerus</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	2x1 sesudah makan, dihabiskan
45	Ny. S	47 tahun	P	12/05/2023	Fraktur <i>of lateral malleolus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
46	Ny. M	47 tahun	P	12/06/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Antasida	Antasida	10	Tablet	3x1 sebelum makan
47	Tn. A	48 tahun	L	13/11/2023	Fraktur <i>of other parts of femur</i>	Mefinal 500 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
48	Ny. R	49 tahun	P	24/03/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
49	Ny. K	49 tahun	P	13/11/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Tramadol 50 mg	Opioid	10	Capsul	1x1 sesudah makan
						Panthoprazole 20 mg	PPI	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
50	Ny. E	49 tahun	P	09/01/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
51	Ny. S	49 tahun	P	06/04/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi- malam
52	Ny. L	50 tahun	P	21/02/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Nutiflam 260 mg	Suplemen	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
53	Tn. Z	50 tahun	L	10/10/2023	Fraktur <i>of calcaneus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
54	Tn. S	52 tahun	L	27/06/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan jika nyeri
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
55	Tn. H	52 tahun	L	17/07/2023	Fraktur <i>of other toe</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	15	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
56	Ny. U	55 tahun	P	22/09/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Proclozam 10 mg	Psikotropika	7	Tablet	1x1 sesudah makan
57	Ny. H	55 tahun	P	22/06/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Tramadol 50 mg	Opioid	7	Capsul	2x1 sesudah makan
58	Tn. A	55 tahun	L	10/02/2023	Fraktur of shaft of ulna	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	5	Capsul	1x1 sebelum makan
59	Tn. J	56 tahun	L	03/07/2023	Fraktur of lower end of tibia	Ketorolac 10 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
60	Ny. Y	57 tahun	P	23/05/2023	Fraktur of lateral malleolus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Vitamin b12	Vitamin	12	Tablet	1x1 sesudah makan
61	Ny. S	57 tahun	P	17/04/2023	Fraktur of <i>other toe</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
62	Tn. J	57 tahun	L	13/02/2023	Fraktur of <i>mandible</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makann
						Calcium lactat 500 mg	Elektrolit	20	Tablet	1x1 sesudah makan
63	Ny. P	57 tahun	P	16/02/2023	Fraktur of <i>lower end of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
64	Ny. I	58 tahun	P	8/08/2023	Fraktur of <i>shaft of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	7	Tablet	1x1 sesudah makan
65	Ny. R	58 tahun	P	11/09/2023	Fraktur of <i>other parts of forearm</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
66	Ny. Z	58 tahun	P	6/10/2023	Fraktur of upper end of humerus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
67	Tn. K	58 tahun	L	12/01/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
68	Tn. b	59 tahun	L	19/01/2023	Fraktur of other toe	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
69	Ny. Z	59 tahun	P	17/11/2023	Fraktur of clavicle	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Tablet	2x1 sebelum makan
70	Ny. T	60 tahun	P	27/08/2023	Fraktur of lower end of radius	Etoricoxib 60 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
71	Ny. N	61 tahun	P	28/11/2023	Fraktur of <i>bony thorax</i>	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID+Opioid	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Tablet	2x1 sebelum makan
72	Tn. I	61 tahun	L	24/07/2023	Fraktur of <i>clavicle</i>	Keren 25 mg (dexketoprofen)	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
73	Tn. D	62 tahun	L	12/10/2023	Fraktur of <i>clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
74	Ny. S	63 tahun	P	26/09/2023	Fraktur of <i>shaft of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calcium lactat 500 mg	Elektrolit	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sebelum makan
75	Ny. M	63 tahun	P	28/07/2023	Fraktur of <i>lower end of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
76	Tn. M	63 tahun	L	28/08/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
77	Tn. I	64 tahun	L	07/11/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
78	Ny. K	65 tahun	P	13/06/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
79	Ny. m	66 tahun	P	22/06/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Paracemaol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID + Opiod	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
						Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum mkan
80	Ny. R	66 tahun	P	30/03/2023	Fraktur <i>of bony thorax</i>	Ibuprofen 400 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calcium lactat 500 mg	Elektrolit	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Eperisone 50 mg	Relaksan otot	20	Tablet	3x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Vitamin b12	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
81	Ny. M	66 tahun	P	15/09/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	15	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
82	Ny. H	66 tahun	P	04/04/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	1x1 sesudah makan
83	Tn. H	68 tahun	L	10/01/2023	Fraktur <i>of lateral malleolus</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
84	Ny. H	68 tahun	P	16/10/2023	Fraktur <i>of other parts of bony thorax</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Tramadol 50 mg dan paracetamol 500 mg	Opiod + NSAID	10+10	Racikan Capsul	2x1 sesudah makan
85	Ny. S	69 tahun	P	8/05/2023	Fraktur <i>of other parts of femur</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
86	Ny. M	70 tahun	P	21/12/2023	Fraktur <i>of other toe</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
87	Tn. S	70 tahun	L	26/09/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Mecobalamin 250 mg	Suplemen	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sesudah makan
88	Ny. R	70 tahun	P	21/11/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	Opioid + NSAID	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
						Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	10	Tablet	2x1 sesudah makan
89	Ny. C	71 tahun	P	06/06/2023	Fraktur of humerus	Tramadol 50 mg dan paracetamol 500 mg	Opioid+NSAID	8	Racikan capsul	3x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sesudah makan
90	Ny. N	71 tahun	P	8/12/2023	Fraktur of shaft of humerus	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	6	Capsul	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	6	Tablet	1x1 sesudah makan
91	Ny. W	72 tahun	P	30/10/2023	Fraktur <i>of upper end of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sebelum makan
92	Ny. K	73 tahun	P	15/09/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Etoricoxib 60 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
93	Ny. T	73 tahun	P	1/12/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
94	Tn. S	75 tahun	L	14/04/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
95	Ny. M	79 tahun	P	10/08/2023	Fraktur <i>of acetabulum</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
96	Tn. M	79 tahun	L	15/12/2023	Fraktur of other parts of lower leg	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sesudah makan
97	Ny. C	81 tahun	P	14/12/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Tramadol 50 mg dan paracetamol 500 mg	Opioid + NSAID	10+10	Racikan capsul	3x1 sesudah makan
						Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
98	Ny. N	82 tahun	P	06/03/2023	Fraktur of fibula alone	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sebelum makan
99	Ny. J	86 tahun	P	4/08/2023	Fraktur of upper end of ulna	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Vitamin b12	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
100	Ny. R	87 tahun	P	10/02/2023	Fraktur of shaft of tibia	Etoricoxib 60 mg	NSAID (COX-2)	20	Tablet	1x1 sesudah makan



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan

Lampiran 9. Lembar pengumpulan data penelitian kunjungan kedua

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
1	An. R	7 tahun	L	8/08/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan
2	An. Y	8 tahun	L	16/10/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	20	Tablet	2x1 sebelum makan
3	An. M	12 tahun	L	18/12/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	8	Tablet	2x1/2 tab sesudah makan
4	An. k	13 tahun	L	12/12/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	10	Capsul	2x1 sebelum makan
5	An. K	13 tahun	P	11/01/2024	Fraktur <i>of coccyx</i>	Paracetamol 500 mg dan Tramadol 50 mg	Opiod+NSAID	7+7	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
						Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
6	An. M	14 tahun	L	04/01/2024	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1/2 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
7	An. M	15 tahun	L	9/01/2024	Fraktur <i>of shaft of ulna</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
8	An. F	16 tahun	L	13/11/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
9	Tn. A	20 tahun	L	3/03/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
10	Tn. R	20 tahun	L	15/09/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
11	Tn. M	22 tahun	L	12/09/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calcitriol 0,5 mg	Suplemen	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
12	Tn. Y	23 tahun	L	17/11/2023	Fraktur <i>of patella</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
13	Ny. D	24 tahun	P	5/06/2023	Fraktur <i>of other toe</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
14	Tn. Y	25 tahun	L	4/07/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
15	Tn. Y	27 tahun	L	10/08/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
16	Tn. U	27 tahun	L	7/03/2023	Fraktur <i>of patella</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
17	Tn. D	27 tahun	L	4/08/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
18	Ny. Z	29 tahun	P	05/09/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
19	Tn. F	29 tahun	L	13/04/2023	Fraktur <i>of thoracic vertebrata</i>	Trampara tab	Opioid	10	Capsul	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
20	Ny. P	29 tahun	P	19/12/2023	Fraktur <i>tibia fibula</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
21	Ny. W	29 tahun	P	8/08/2023	Fraktur <i>of rib</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
22	Tn. E	29 tahun	L	15/08/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
23	Tn. A	30 tahun	L	8/01/2024	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
24	Tn. A	30 tahun	L	4/05/2023	Fraktur <i>of shaft of ulna</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
25	Ny. S	31 tahun	P	02/02/2023	Fraktur <i>of other parts of forearm</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
26	Tn. R	31 tahun	P	9/06/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
27	Tn. K	31 tahun	L	19/12/2023	Fraktur of metatarsal bone	Tramadol 50 mg	Opioid	8	Capsul	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sebelum makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
28	Tn. G	32 tahun	L	03/04/2023	Fraktur of clavicle	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	20	Capsul	2x1 sesudah makan dihabiskan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	10	Capsul	1x1 sebelum makan
29	Tn. R	34 tahun	L	6/06/2023	Fraktur of lower end of tibia	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sebelum makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
30	Ny. I	35 tahun	P	27/04/2023	Fraktur of metatarsal bone	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calcitriol 0,5 mg	Suplemen	30	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
31	Tn. F	35 tahun	L	14/11/2023	Fraktur of calcaneus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
32	Tn. E	35 tahun	L	8/05/2023	Fraktur of lateral malleolus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
33	Tn. K	36 tahun	L	6/06/2023	Fraktur of lower end of tibia	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
34	Tn. S	40 tahun	L	29/12/2023	Fraktur of upper end of ulna	Tramadol 50 mg	Opioid	10	Capsul	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
35	Ny. M	40 tahun	P	9/05/2023	Fraktur <i>of upper end of tibia</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossoral 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
36	Ny. R	41 tahun	P	20/07/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Deketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
37	Ny. M	42 tahun	P	04/09/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
38	Tn. D	42 tahun	L	03/04/2023	Fraktur <i>of calcaneus</i>	Ketoprofen 100 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
						Cefadroxil 500 mg	Antibiotik	10	Capsul	3x1 sesudah makan
39	Ny. L	43 tahun	P	16/11/2023	Fraktur <i>of illium</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
40	Ny. E	43 tahun	P	12/06/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
41	Tn. N	44 tahun	L	16/01/2024	Fraktur <i>of femur</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	15	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
42	Tn. E	45 tahun	L	18/09/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
						Sanmol 650 mg	Analgesik-antipiretik	14	Tablet	2x1 sesudah makan
43	Tn. J	46 tahun	L	19/10/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
44	Tn. M	46 tahun	L	22/01/2024	Fraktur <i>of shaft of humerus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
45	Ny. S	47 tahun	P	15/06/2023	Fraktur of lateral malleolus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
46	Ny. M	47 tahun	P	3/07/2023	Fraktur of metatarsal bone	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Vitamin	7	Tablet	1x1 sesudah makan
47	Tn. A	48 tahun	L	7/12/2023	Fraktur of other parts of femur	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
48	Ny. R	49 tahun	P	28/04/2023	Fraktur of clavicle	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
49	Ny. K	49 tahun	P	21/12/2023	Fraktur of clavicle	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
50	Ny. E	49 tahun	P	14/02/2023	Fraktur of lower end of radius	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
51	Ny. S	49 tahun	P	9/05/2023	Fraktur of metatarsal bone	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Metilprednisolon 4 mg	Antiperadangan	20	Tablet	3x1 sesudah makan
52	Ny. L	50 tahun	P	16/03/2023	Fraktur of clavicle	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
53	Tn. Z	50 tahun	L	03/11/2023	Fraktur of calcaneus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
54	Tn. S	52 tahun	L	18/07/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 15 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	2x1/2 tab sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
55	Tn. H	52 tahun	L	21/08/2023	Fraktur of other toe	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
56	Ny. U	55 tahun	P	17/10/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Proclozam 10 mg	Psikotropika	7	Tablet	1x1 sesudah makan
57	Ny. H	55 tahun	P	14/07/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Coxiron 120 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
58	Tn. A	55 tahun	L	13/03/2023	Fraktur of shaft of ulna	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Eperisone 50 mg	Relaksan otot	10	Tablet	3x1 sesudah makan
59	Tn. J	56 tahun	L	3/08/2023	Fraktur of lower end of tibia	Ketorolac 10 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
60	Ny. Y	57 tahun	P	20/06/2023	Fraktur of lateral malleolus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Eperisone 50 mg	Relaksan otot	10	Tablet	3x1 sesudah makan
61	Ny. S	57 tahun	P	11/05/2023	Fraktur of other toe	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
62	Tn. J	57 tahun	L	2/03/2023	Fraktur of mandible	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
63	Ny. P	57 tahun	P	10/03/2023	Fraktur of lower end of radius	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
64	Ny. I	58 tahun	P	01/09/2023	Fraktur of shaft of radius	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Ossopan 800 mg	Vitamin	7	Tablet	1x1 sesudah makan
65	Ny. R	58 tahun	P	3/10/2023	Fraktur of other parts of forearm	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
66	Ny. Z	58 tahun	P	09/11/2023	Fraktur of upper end of humerus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
67	Tn. K	58 tahun	L	13/02/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	3x1 sesudah makan
68	Tn. b	59 tahun	L	20/02/2023	Fraktur of other toe	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
69	Ny. Z	59 tahun	P	26/12/2023	Fraktur of clavicle	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Tablet	2x1 sesudah makan
70	Ny. T	60 tahun	P	6/02/2023	Fraktur of lower end of radius	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
71	Ny. N	61 tahun	P	21/12/2023	Fraktur of bony thorax	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID + Opioid	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
						Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sebelum makan
72	Tn. I	61 tahun	L	15/08/2023	Fraktur of clavicle	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
73	Tn. D	62 tahun	L	14/11/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
74	Ny. S	63 tahun	P	3/10/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calcium lactat 500 mg	Elektrolit	14	Tablet	1x1 sesudah makan
75	Ny. M	63 tahun	P	22/08/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
76	Tn. M	63 tahun	L	19/09/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
77	Tn. I	64 tahun	L	5/12/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
78	Ny. K	65 tahun	P	3/07/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
79	Ny. m	66 tahun	P	14/07/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID + Opioid	10+10	Racikan capsul	1x1 sesudah makan
						Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sesudah makan
80	Ny. R	66 tahun	P	17/04/2023	Fraktur <i>of bony thorax</i>	Ibuprofen 400 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Eperiosne 50 mg	Relaksan otot	10	Tablet	3x1 sebelum makan
						Omeprazole 30 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sesudah makan
81	Ny. M	66 tahun	P	3/10/2023	Fraktur <i>of upperend of ulna</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ondansetron 4 mg	Antiemetik	15	Tablet	3x1 sebelum makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
82	Ny. H	66 tahun	P	1/05/2023	Fraktur of clavicle	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Omeprazole 30 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sebelum makan
83	Tn. H	68 tahun	L	3/02/2023	Fraktur of lateral malleolus	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
84	Ny. H	68 tahun	P	16/11/2023	Fraktur of other parts of bonythorax	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Tramadol 50 mg	Opoïd	14	Capsul	1x1 sesudah makan
85	Ny. S	69 tahun	P	13/06/2023	Fraktur of other parts of femur	Eterocoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
86	Ny. M	70 tahun	P	5/01/2024	Fraktur of other toe	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
87	Tn. S	70 tahun	L	10/10/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
88	Ny. R	70 tahun	P	11/12/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID +Opioid	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
89	Ny. C	71 tahun	P	4/07/2023	Fraktur of humerus	Keren 25 mg (dexketoprofen)	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
90	Ny. N	71 tahun	P	18/01/2024	Fraktur of shaft of humerus	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	6	Capsul	1x1 sebelum makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	6	Tablet	1x1 sesudah makan
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
91	Ny. W	72 tahun	P	24/11/2023	Fraktur of upper end of radius	Meloxicam 15 mg	NSAID (COX-2)	5	Tablet	2x 1/2 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
92	Ny. K	73 tahun	P	13/10/2023	Fraktur of lower end of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
93	Ny. T	73 tahun	P	4/01/2024	Fraktur of lower end of radius	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Eperisone 50 mg	Relaksan otot	10	Tablet	3x1 sesudah makan
94	Tn. S	75 tahun	L	16/05/2023	Fraktur of shaft of tibia	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
95	Ny. M	79 tahun	P	15/09/2023	Fraktur of acetabulum	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
96	Tn. M	79 tahun	L	16/01/2024	Fraktur of other parts of lower leg	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	5	Capsul	1x1 sebelum makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang Diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
97	Ny. C	81 tahun	P	12/01/2024	Fraktur <i>of lumbar vertebrata</i>	Tramadol 50 mg dan paracetamol 500 mg	Opioid + NSAID	10+10	Racikan capsul	3x1 sesudah makan
						Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	5	Capsul	1x1 sesudah makan
98	Ny. N	82 tahun	P	07/04/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Tramadol 50 mg	Opioid	20	Capsul	3x1 sebelum makan
						Pepzol 20 mg	PPI	8	Tablet	2x1 sebelum makan
99	Ny. J	86 tahun	P	04/09/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
100	Ny. R	87 tahun	P	14/03/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitox 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan

Lampiran 10. Lembar pengumpulan data penelitian kunjungan ketiga

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
1	An. R	7 tahun	L	12/09/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1/2 sesudah makan
2	An. Y	8 tahun	L	07/11/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1/2 sesudah makan jika nyeri
						Omeprazole 20 mg	PPI	20	Capsul	2x1 sebelum makan
3	An. M	12 tahun	L	12/01/2024	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	2x1/2 sesudah makan pagi-malam
4	An. K	13 tahun	L	5/01/2024	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1/2 sesudah makan jika nyeri
5	An. K	13 tahun	P	15/02/2024	Fraktur <i>of coccyx</i>	Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	10	Capsul	1x1 sebelum makan
						Etoricoxib 60 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
6	An. M	14 tahun	L	06/02/2024	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1/2 sesudah makan jika nyeri
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
7	An. M	15 tahun	L	22/02/2024	Fraktur <i>of shaft of ulna</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
8	An. F	16 tahun	L	19/12/2023	Fraktur of metatarsal bone	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1/2 sesudah makan jika nyeri
9	Tn. A	20 tahun	L	04/04/2023	Fraktur of metatarsal bone	Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
10	Tn. R	20 tahun	L	23/10/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
11	Tn. M	22 tahun	L	17/10/2023	Fraktur of shaft of radius	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calcitriol 0,5 mg	Suplemen	30	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
12	Tn. Y	23 tahun	L	21/12/2023	Fraktur of patella	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1/2 sesudah makan jika nyeri
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
13	Ny. D	22 tahun	P	3/07/2023	Fraktur of other toe	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi malam

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
14	Tn. Y	25 tahun	L	4/08/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
15	Tn. Y	25 tahun	L	12/09/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
16	Tn. U	27 tahun	L	04/04/2023	Fraktur <i>of patella</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan jika nyeri
17	Tn. D	27 tahun	L	04/09/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	5	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
18	Ny. Z	27 tahun	P	9/10/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makann
19	Tn. F	29 tahun	L	11/05/2023	Fraktur <i>of thoracic vertebrata</i>	Trampara	Opioid	10	Tablet	1x1 sesudah makann



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
20	Ny. P	29 tahun	P	12/01/2024	Fraktur <i>tibia fibula</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calcitriol 0,5 mg	Suplemen	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
21	Ny. W	29 tahun	P	19/09/2023	Fraktur <i>of rib</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan jika nyeri
22	Tn. E	29 tahun	L	25/09/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan jika nyeri
23	Tn. A	29 tahun	L	12/02/2024	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
24	Tn. A	30 tahun	L	6/06/2023	Fraktur <i>of shaft of ulna</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
25	Ny. S	31 tahun	P	03/03/2023	Fraktur <i>of other parts of forearm</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan nyeri
26	Tn. R	29 tahun	L	13/07/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
27	Tn. K	31 tahun	L	22/01/2024	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
28	Tn. G	32 tahun	L	2/05/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan jika nyeri
						Ciprofloxacin 500 mg	Antibiotik	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	20	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
29	Tn. R	34 tahun	L	10/07/2023	Fraktur of lower end of tibia	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
30	Ny. I	35 tahun	P	29/05/2023	Fraktur of metatarsal bone	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
31	Tn. F	35 tahun	L	14/12/2023	Fraktur of calcaneus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
32	Tn. E	35 tahun	L	5/06/2023	Fraktur of lateral malleolus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
33	Tn. K	36 tahun	L	10/07/2023	Fraktur of lower end of tibia	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
34	Tn. S	40 tahun	L	30/01/2024	Fraktur of upper end of ulna	Trampara	Opioid	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
35	Ny. M	40 tahun	P	12/06/2023	Fraktur of upper end of tibia	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
36	Ny. R	41 tahun	P	22/08/2023	Fraktur of clavicle	Dektetoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
37	Ny. M	42 tahun	P	5/10/2023	Fraktur of shaft of tibia	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	tablet	1x1 sesudah makan
38	Tn. D	42 tahun	L	1/05/2023	Fraktur of calcaneus	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
39	Ny. L	43 tahun	P	8/12/2023	Fraktur <i>of illium</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
40	Ny. E	43 tahun	P	11/07/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
41	Tn. N	44 tahun	L	9/02/2024	Fraktur <i>of femur</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Zypras 0,25 mg	Antidepresan	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
42	Tn. E	45 tahun	L	20/10/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Trampara	Opioid	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Relaxon 50 mg	Relaksan otot	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
43	Tn. J	46 tahun	L	08/11/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makann
44	Tn. M	46 tahun	L	20/02/2024	Fraktur <i>of shaft of humerus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
45	Ny. S	47 tahun	P	18/07/2023	Fraktur <i>of lateral malleolus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
46	Ny. M	47 tahun	P	3/08/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
47	Tn. A	46 tahun	L	9/01/2024	Fraktur <i>of other parts of femur</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan jika nyeri
48	Ny. R	49 tahun	P	30/05/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
49	Ny. K	49 tahun	P	11/01/2024	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
50	Ny. E	49 tahun	P	21/03/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
51	Ny. S	49 tahun	P	6/06/2023	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
52	Ny. L	50 tahun	P	10/04/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
53	Tn. Z	50 tahun	L	11/12/2023	Fraktur <i>of calcaneus</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
54	Tn. S	52 tahun	L	21/08/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
55	Tn. H	52 tahun	L	25/09/2023	Fraktur <i>of other toe</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
56	Ny. U	55 tahun	P	16/11/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
57	Ny. H	55 tahun	P	15/08/2023	Fraktur <i>of lumbar vertebrata</i>	Coxiron 90 mg(etoricoxib)	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
58	Tn. A	55 tahun	L	14/04/2023	Fraktur <i>of shaft of ulna</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
59	Tn. J	56 tahun	L	22/09/2023	Fraktur <i>of lower end of tibia</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
60	Ny. Y	57 tahun	P	24/07/2023	Fraktur <i>of lateral malleolus</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
61	Ny. S	57 tahun	P	12/06/2023	Fraktur <i>of other toe</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	15	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	10	Tablet	1x1 sesudah makan
62	Tn. J	57 tahun	L	03/04/2023	Fraktur <i>of mandible</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam



No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
63	Ny. P	57 tahun	P	13/04/2023	Fraktur of lower end of radius	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
64	Ny. I	58 tahun	P	3/10/2023	Fraktur of shaft of radius	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
65	Ny. R	58 tahun	P	02/11/2023	Fraktur of other parts of forearm	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	15	Tablet	1x1 sesudah makan
66	Ny. Z	58 tahun	P	11/12/2023	Fraktur of upper end of humerus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
67	Tn. K	58 tahun	L	14/03/2023	Fraktur of lumbar vertebrata	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
						Metilprednisolon 4 mg	Antiperadangan	20	Tablet	3x1 sesudah makan
68	Tn. b	59 tahun	L	14/03/2023	Fraktur of other toe	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
69	Ny. Z	59 tahun	P	12/01/2024	Fraktur <i>of clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	14	Capsul	2x1 sebelum makan
70	Ny. T	60 tahun	P	2/03/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan jika nyeri
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
71	Ny. N	61 tahun	P	15/01/2024	Fraktur <i>of bony thorax</i>	Kalium diklofenak 50 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
72	Tn. I	61 tahun	L	08/09/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
73	Tn. D	62 tahun	L	11/12/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
74	Ny. S	63 tahun	P	06/11/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
75	Ny. M	63 tahun	P	18/09/2023	Fraktur <i>of lower end of radius</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
76	Tn. M	63 tahun	L	19/10/2023	Fraktur <i>of clavicle</i>	Natrium diklofenak 25 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
77	Tn. I	64 tahun	L	11/01/2024	Fraktur <i>of metatarsal bone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan jika nyeri
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
78	Ny. K	65 tahun	P	3/08/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	20	Tablet	1x1 sesudah makan
79	Ny. M	66 tahun	P	15/08/2023	Fraktur <i>of shaft of radius</i>	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID + Opioid	10+10	Racikan capsul	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	2x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sesudah makan
80	Ny. R	66 tahun	L	15/05/2023	Fraktur of <i>bony thorax</i>	Ibuprofen 400 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Eperisone 50 mg	Relaksan otot	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sesudah makan
81	Ny. M	66 tahun	P	02/11/2023	Fraktur of <i>upper end of ulna</i>	Mefinal 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	1x1 sesudah makan jika nyeri
						Ossopan 800 mg	Vitamin	7	Tablet	1x1 sesudah makan
82	Ny. H	66 tahun	P	2/06/2023	Fraktur of <i>clavicle</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	20	Tablet	3x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
83	Tn. H	68 tahun	L	06/03/2023	Fraktur of lateral malleolus	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
84	Ny. H	68 tahun	P	19/12/2023	Fraktur of other parts of bony thorax	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID + Opioid	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan pagi-malam
						Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
85	Ny. S	69 tahun	P	10/07/2023	Fraktur of other parts of femur	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
86	Ny. M	70 tahun	P	06/02/2024	Fraktur of other toe	Kalium diklofenak 50 mg	NSAID (COX-1)	14	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam
87	Tn. S	70 tahun	L	09/11/2023	Fraktur of shaft of radius	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
88	Ny. R	70 tahun	P	16/01/2024	Fraktur of lumbar vertebrata	Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID + Opioid	10+10	Racikan capsul	2x1 sesudah makan
						Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	14	Tablet	2x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
89	Ny. C	71 tahun	P	3/08/2023	Fraktur of humerus	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
90	Ny. N	71 tahun	P	13/02/2024	Fraktur of shaft of humerus	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	6	Capsul	2x1 sebelum makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	6	Tablet	1x1 sesudah makan
91	Ny. W	72 tahun	P	19/12/2023	Fraktur of upper end of radius	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	5	Capsul	1x1 sebelum makan
92	Ny. K	73 tahun	P	20/11/2023	Fraktur of lower end of radius	Mefinal 500 mg	NSAID (COX-1)	7	Tablet	2x1 sesudah makan jika nyeri
						Relaxon 50 mg	Relaksan otot	6	Tablet	2x1 sesudah makan
93	Ny. T	73 tahun	P	19/02/2024	Fraktur of lower end of radius	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Eperisone 10 mg	Relaksan otot	6	Tablet	3x1 sesudah makan
94	Tn. S	75 tahun	L	19/06/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Dexketoprofen 25 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
95	Ny. M	79 tahun	P	20/10/2023	Fraktur <i>of acetabulum</i>	Coxiron 90 mg (etoricoxib)	NSAID (COX-2)	10	Tablet	1x1 sesudah makan
						Ossopan 800 mg	Vitamin	30	Tablet	1x1 sesudah makan
96	Tn. M	79 tahun	L	19/02/2024	Fraktur <i>of other parts of lower leg</i>	Meloxicam 7,5 mg	NSAID (COX-2)	10	Tablet	2x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	10	Capsul	2x1 sebelum makan
						Paracetamol 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
97	Ny. C	81 tahun	P	13/02/2024	Fraktur <i>of lumbar vertebrata</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Paracetamol 500 mg dan tramadol 50 mg	NSAID +Opioid	10+10	Racikan capsul	3x1 sesudah makan

No	Inisial	Usia	Jenis kelamin	Tanggal resep	Jenis fraktur	Zat aktif yang diresepkan	Golongan obat yang diresepkan	Jumlah obat	Bentuk sediaan	Aturan pakai
						Omeprazole 20 mg	PPI	7	Tablet	1x1 sebelum makan
98	Ny. N	82 tahun	P	8/05/2023	Fraktur <i>of fibula alone</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	10	Tablet	3x1 sesudah makan
						Omeprazole 20 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
99	Ny. J	86 tahun	P	10/10/2023	Fraktur <i>of upper end of ulna</i>	Asam mefenamat 500 mg	NSAID (COX-1)	6	Tablet	2x1 sesudah makan pagi-malam jika nyeri
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sesudah makan
100	Ny. R	87 tahun	P	04/04/2023	Fraktur <i>of shaft of tibia</i>	Etoricoxib 90 mg	NSAID (COX-2)	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Calitoz 500 mg	Suplemen makanan	7	Tablet	1x1 sesudah makan
						Lansoprazole 30 mg	PPI	7	Capsul	1x1 sebelum makan



Lampiran 11. Lembar pengolahan data penelitian karakteristik sosiodemografi

No	Inisial	Usia									Jenis kelamin	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
1	An. R	√									√	
2	An. Y	√									√	
3	An. M		√								√	
4	An. K		√								√	
5	An. K		√									√
6	An. M		√								√	
7	An. M		√								√	
8	An. F		√								√	
9	Tn. A			√							√	
10	Tn. R			√							√	
11	Tn. M			√							√	
12	Tn. Y			√							√	
13	Ny. D			√								√
14	Tn. Y			√							√	
15	Tn. Y			√							√	
16	Tn. U				√						√	
17	Tn. D				√						√	
18	Ny. Z				√							√

No	Inisial	Usia									Jenis kelamin	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
19	Tn. F				√						√	
20	Ny. P				√							√
21	Ny. W				√							√
22	Tn. E				√						√	
23	Tn. A				√						√	
24	Tn. A				√						√	
25	Ny. S				√							√
26	Tn. R				√						√	
27	Tn. K				√						√	
28	Tn. G				√						√	
29	Tn. R				√						√	
30	Ny. I				√							√
31	Tn. F				√						√	
32	Tn. E				√						√	
33	Tn. K					√					√	
34	Tn. S					√					√	
35	Ny. M					√						√
36	Ny. R					√						√
37	Ny. M					√						√

No	Inisial	Usia									Jenis kelamin	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
38	Tn. D					√					√	
39	Ny. L					√						√
40	Ny. E					√						√
41	Tn. N					√					√	
42	Tn. E					√					√	
43	Tn. J						√				√	
44	Tn. M						√				√	
45	Ny. S						√					√
46	Ny. M						√					√
47	Tn. A						√				√	
48	Ny. R						√					√
49	Ny. K						√					√
50	Ny. E						√					√
51	Ny. S						√					√
52	Ny. L						√					√
53	Tn. Z						√				√	
54	Tn. S						√				√	
55	Tn. H						√				√	
56	Ny. U						√					√

No	Inisial	Usia									Jenis kelamin	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
57	Ny. H						√					√
58	Tn. A						√				√	
59	Tn. J							√			√	
60	Ny. Y							√				√
61	Ny. S							√				√
62	Tn. J							√			√	
63	Ny. P							√				√
64	Ny. I							√				√
65	Ny. R							√				√
66	Ny. Z							√				√
67	Tn. K							√			√	
68	Tn. b							√			√	
69	Ny. Z							√				√
70	Ny. T							√				√
71	Ny. N							√				√
72	Tn. I							√			√	
73	Tn. D							√			√	
74	Ny. S							√				√
75	Ny. M							√				√

No	Inisial	Usia									Jenis kelamin	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
76	Tn. M							√			√	
77	Tn. I							√			√	
78	Ny. K							√				√
79	Ny. m								√			√
80	Ny. R								√			√
81	Ny. M								√			√
82	Ny. H								√			√
83	Tn. H								√		√	
84	Ny. H								√			√
85	Ny. S								√			√
86	Ny. M								√			√
87	Tn. S								√		√	
88	Ny. R								√			√
89	Ny. C								√			√
90	Ny. N								√			√
91	Ny. W								√			√
92	Ny. K								√			√
93	Ny. T								√			√
94	Tn. S								√		√	

No	Inisial	Usia									Jenis kelamin	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
95	Ny. M									√		√
96	Tn. M									√	√	
97	Ny. C									√		√
98	Ny. N									√		√
99	Ny. J									√		√
100	Ny. R									√		√

Keterangan:

**Usia**

1 = 5-11 tahun

2 = 12-16 tahun

3 = 17-25 tahun

4 = 26-35 tahun

5 = 36-45 tahun

6 = 46-55 tahun

7 = 56-65 tahun

8 = 65-75 tahun

9 = >75 tahun

**Jenis kelamin**

1 = Laki laki

2 = Perempuan

Lampiran 12. Lembar pengolahan data penelitian

No	Inisial	Jenis fraktur																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	An. R	√																													
2	An. Y																					√									
3	An. M				√																										
4	An. K																													√	
5	An. K														√																
6	An. M	√																													
7	An. M																													√	
8	An. F					√																									
9	Tn. A					√																									
10	Tn. R	√																													
11	Tn. M	√																													
12	Tn. Y																												√		
13	Ny. D										√																				
14	Tn. Y				√																										
15	Tn. Y																													√	
16	Tn. U					√																									
17	Tn. D											√																			
18	Ny. Z				√																										

No	Inisial	Jenis fraktur																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	Tn. F																								√						
20	Ny. P															√															
21	Ny. W				√																										
22	Tn. E										√																				
23	Tn. A				√																										
24	Tn. A																														√
25	Ny. S																									√					
26	Tn. R	√																													
27	Tn. K				√																										
28	Tn. G												√																		
29	Tn. R				√																										
30	Ny. I				√																										
31	Tn. F													√																	
32	Tn. E												√																		
33	Tn. K																							√							
34	Tn. S																													√	
35	Ny. M																				√										
36	Ny. R				√																										
37	Ny. M																					√									
38	Tn. D													√																	



No	Inisial	Jenis fraktur																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
39	Ny. L											√																			
40	Ny. E				√																										
41	Tn. N					√																									
42	Tn. E	√																													
43	Tn. J																					√									
44	Tn. M					√																									
45	Ny. S												√																		
46	Ny. M																														
47	Tn. A				√																										
48	Ny. R				√																										
49	Ny. K										√																				
50	Ny. E		√																												
51	Ny. S					√																									
52	Ny. L				√																										
53	Tn. Z														√																
54	Tn. S	√																													
55	Tn. H									√																					
56	Ny. U	√																													
57	Ny. H																						√								
58	Tn. A																														√

No	Inisial	Jenis fraktur																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
59	Tn. J																								√						
60	Ny. Y												√																		
61	Ny. S									√																					
62	Tn. J																								√						
63	Ny. P	√																													
64	Ny. I	√																													
65	Ny. R																									√					
66	Ny. Z								√																						
67	Tn. K																							√							
68	Tn. b									√																					
69	Ny. Z				√																										
70	Ny. T		√																												
71	Ny. N											√																			
72	Tn. I				√																										
73	Tn. D				√																										
74	Ny. S	√																													
75	Ny. M		√																												
76	Tn. M				√																										
77	Tn. I																												√		
78	Ny. K	√																													

No	Inisial	Jenis fraktur																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
79	Ny. m	√																													
80	Ny. R							√																							
81	Ny. M																													√	
82	Ny. H																						√								
83	Tn. H																												√		
84	Ny. H												√																		
85	Ny. S						√																								
86	Ny. M									√																					
87	Tn. S																						√								
88	Ny. R														√																
89	Ny. C							√																							
90	Ny. N						√																								
91	Ny. W			√																											
92	Ny. K		√																												
93	Ny. T		√																												
94	Tn. S																					√									
95	Ny. M										√																				
96	Tn. M																											√			
97	Ny. C																						√								
98	Ny. N						√																								

No	Inisial	Jenis fraktur																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
99	Ny. J																															√	
100	Ny. R																											√					

Keterangan:

1 = Fraktur *of shaft of radius*

2 = Fraktur *of lower end of radius*

3 = Fraktur *of upper end of radius*

4 = Fraktur *of clavicle*

5 = Fraktur *of metatarsal bone*

6 = Fraktur *of other parts femur*

7 = Fraktur *of shaft of humerus*

8 = Fraktur *of humerus*

9 = Fraktur *of upper end of humerus*

10 = Fraktur *of other toe*

11 = Fraktur *of acetabulum*

12 = Fraktur *of bony thorax*

13 = Fraktur *of other parts of bony thorax*

- 14 = Fraktur of *calcaneus*
- 15 = Fraktur of *coccyx*
- 16 = Fraktur of *tibia fibula*
- 17 = Fraktur of *fibula alone*
- 18 = Fraktur of *ilium*
- 19 = Fraktur of *lateral malleolus*
- 20 = Fraktur of *upper end of tibia*
- 21 = Fraktur of *shaft of tibia*
- 22 = Fraktur of *lower of tibia*
- 23 = Fraktur of *lumbar vertebrata*
- 24 = Fraktur of *mandible*
- 25 = Fraktur of *other parts of forearm*
- 26 = Fraktur of *other parts of lower leg*
- 27 = Fraktur of *patella*
- 28 = Fraktur of *rib*
- 29 = Fraktur of *upper of ulna*
- 30 = Fraktur of *shaft of ulna*

No	Inisial	Golongan analgesik		Dosis yang diberikan		Zat aktif yang diresepkan										
		1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	An. R			√												
2	An. Y		√	√									√			
3	An. M		√		√								√			
4	An. K		√	√									√			
5	An. K		√	√									√			
6	An. M	√	√	√			√				√	√				
7	An. M		√	√									√			
8	An. F		√	√						√						
9	Tn. A	√	√	√								√	√			
10	Tn. R		√	√			√									
11	Tn. M		√	√						√			√			
12	Tn. Y		√	√			√									
13	Ny. D		√	√						√						
14	Tn. Y		√	√			√			√						
15	Tn. Y	√	√	√			√					√				
16	Tn. U		√	√				√								
17	Tn. D		√	√			√						√			
18	Ny. Z		√	√				√								
19	Tn. F		√	√				√								
20	Ny. P	√	√	√							√	√				
21	Ny. W		√	√			√									
22	Tn. E		√	√									√			
23	Tn. A		√	√				√								
24	Tn. A	√	√	√								√	√			

No	Inisial	Golongan analgesik		Dosis yang diberikan		Zat aktif yang diresepkan										
		1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ny. S		√	√		√				√						
26	Tn. R		√	√						√						
27	Tn. K	√	√	√			√					√				
28	Tn. G	√	√	√						√		√	√			
29	Tn. R	√	√	√								√	√			
30	Ny. I		√	√		√							√			
31	Tn. F	√	√	√		√						√				
32	Tn. E		√	√						√						
33	Tn. K		√		√					√						
34	Tn. S		√	√		√										
35	Ny. M	√		√								√				
36	Ny. R		√	√		√	√									
37	Ny. M		√	√		√										
38	Tn. D	√	√	√			√					√				
39	Ny. L		√	√						√			√	√		
40	Ny. E		√	√		√										
41	Tn. N		√	√						√			√			
42	Tn. E		√	√			√									
43	Tn. J	√	√	√			√	√		√		√				
44	Tn. M		√	√		√										
45	Ny. S		√	√						√			√			
46	Ny. M		√	√						√	√					
47	Tn. A		√	√						√			√			
48	Ny. R		√	√									√			

No	Inisial	Golongan analgesik		Dosis yang diberikan		Zat aktif yang diresepkan										
		1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ny. K		√		√	√										
50	Ny. E	√	√	√								√	√			
51	Ny. S		√	√						√			√			
52	Ny. L		√	√						√						
53	Tn. Z		√	√						√						
54	Tn. S		√	√						√						
55	Tn. H		√	√						√			√			
56	Ny. U		√	√			√									
57	Ny. H		√	√			√			√						
58	Tn. A	√	√	√			√					√				
59	Tn. J		√	√						√			√			
60	Ny. Y		√	√					√				√			
61	Ny. S		√	√		√				√	√					
62	Tn. J		√	√						√						
63	Ny. P		√	√						√			√			
64	Ny. I		√	√			√									
65	Ny. R		√	√		√	√			√						
66	Ny. Z		√	√						√						
67	Tn. K		√	√						√						
68	Tn. b		√	√			√			√			√			
69	Ny. Z		√	√						√						
70	Ny. T		√	√						√			√			
71	Ny. N		√	√			√									
72	Tn. I	√	√	√						√	√	√				



No	Inisial	Golongan analgesik		Dosis yang diberikan		Zat aktif yang diresepkan										
		1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Tn. D		√	√		√										
74	Ny. S		√	√						√						
75	Ny. M		√	√						√						
76	Tn. M		√	√			√			√						
77	Tn. I		√	√		√							√			
78	Ny. K		√	√									√			
79	Ny. m		√	√			√									
80	Ny. R	√	√	√			√			√	√	√				
81	Ny. M		√	√				√								
82	Ny. H		√	√			√									
83	Tn. H		√	√		√							√			
84	Ny. H		√	√									√			
85	Ny. S		√	√						√						
86	Ny. M		√	√		√	√									
87	Tn. S		√	√			√			√						
88	Ny. R		√	√						√						
89	Ny. C	√	√	√						√	√	√				
90	Ny. N	√	√	√		√				√	√	√				
91	Ny. W		√	√			√				√		√			
92	Ny. K		√		√					√	√					
93	Ny. T		√	√			√			√						
94	Tn. S		√	√			√									
95	Ny. M		√	√		√										
96	Tn. M		√	√			√									

No	Inisial	Golongan analgesik		Dosis yang diberikan		Zat aktif yang diresepkan										
		1	2	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ny. C		√	√						√						
98	Ny. N	√	√	√			√				√	√				
99	Ny. J	√	√	√		√						√	√			
100	Ny. R		√	√						√						

Keterangan:

**Golongan analgesik yang diberikan**

1 = Analgesik opioid

2 = Analgesik non opioid

**Ketepatan dosis yang diberikan**

1 = Sesuai

2 = Tidak sesuai

**Jenis zat aktif yang diresepkan**

1 = Dexketoprofen

2 = Etoricoxib

11 = Natrium diklofenak

3 = Ibuprofen

4 = Ketorolac

5 = Meloxicam

6 = Paracetamol

7 = Tramadol

8 = Asam mefenamat

9 = Ketoprofen

10 = Kalium diklofenak

No	Inisal	penggunaan analgesik		Bentuk sediaan analgesik			Penyesuaian dosis										Obat penyerta yang diresepkan																														
							1 – 2 bulan					2 – 3 bulan																																			
		1	2	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
1	An.R	√		√			√				√																																				
2	An.Y	√		√			√				√														√																						
3	An.M	√		√																																											
4	An.K	√		√			√				√																																				
5	An.K		√	√																																											
6	An.M	√		√			√				√																																				
7	An.M	√		√			√				√																																				
8	An. F	√		√	√						√	√																																			
9	Tn. A	√		√			√																																								
10	Tn. R		√	√							√																																				
11	Tn.M	√		√			√				√																																				
12	Tn. Y	√		√			√																																								
13	Ny.D	√		√			√				√																																				
14	Tn. Y		√		√						√	√																																			
15	Tn. Y	√		√			√				√																																				
16	Tn. U	√		√			√				√																																				
17	Tn. D	√		√			√				√																																				













Keterangan :

**Penggunaan analgesik**

1 = Tunggal

2 = Kombinasi

**Bentuk sediaan analgesik**

1 = Tablet

2 = Kapsul

3 = Racikan

**Dosis yang diberikan**

1 = Sesuai

2 = Tidak sesuai

**Penyesuaian dosis yang diberikan**

1 = Tidak ada penyesuaian

2 = Penurunan dosis, aturan pakai tetap

3 = Penambahan dosis, aturan pakai tetap

4 = Dosis sekali pakai tetap, aturan pakai dikurangi

5 = Obat dengan perubahan zat aktif selama masa pengobatan

**Obat penyerta**

1 = Antasida

3 = Calcium lactat

5 = Cefadroxil

7 = Dexamethasone

9 = Lansoprazole

11 = Metil prednisolon

13 = Omeprazole

15 = Pantoprazole

17 = Relaxon

19 = Vitamin b12

21 = Sanmol

22 = Paracetamol

2 = Calcitriol

4 = Calitoz

6 = Ciprofloxacin

8 = Eperisone

10 = Mecobalamin

12 = Nutrifalam

14 = Ossopan

16 = Proclozam

18 = Vitamin b com

20 = Ondansetron

23 = Zypras

## Lampiran 13. Hasil Uji Data SPSS

## 1. Frekuensi karakteristik sosio-demografi

## a. Usia pasien

		Usia pasien			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	5-11 tahun	2	2.0	2.0	2.0
	12-16 tahun	6	6.0	6.0	8.0
	17-25 tahun	7	7.0	7.0	15.0
	26-35 tahun	17	17.0	17.0	32.0
	36-45 tahun	10	10.0	10.0	42.0
	46-55 tahun	16	16.0	16.0	58.0
	56-65 tahun	20	20.0	20.0	78.0
	66-75 tahun	16	16.0	16.0	93.0
	>75 tahun	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## b. Jenis kelamin

		Jenis kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Laki- laki	49	49.0	49.0	49.0
	Perempuan	51	51.0	51.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

## 2. Jenis fraktur

		Jenis fraktur			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	fraktur of acetabulum	1	1.0	1.0	1.0
	fraktur of bony thorax	2	2.0	2.0	3.0
	fraktur of calcaneus	3	3.0	3.0	6.0
	fraktur of clavicle	15	15.0	15.0	21.0
	fraktur of coccyx	1	1.0	1.0	22.0
	fraktur of fibula alone	3	3.0	3.0	25.0
	fraktur of humerus	1	1.0	1.0	26.0
	fraktur of illium	1	1.0	1.0	27.0
	fraktur of lateral malleolus	4	4.0	4.0	31.0
	fraktur of lower end of radius	6	6.0	6.0	37.0
	fraktur of lower end of tibia	3	3.0	3.0	40.0
	fraktur of lumbar vertebrata	5	5.0	5.0	45.0

<b>Jenis fraktur</b>				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
fraktur of mandible	1	1.0	1.0	46.0
fraktur of metatarsal	7	7.0	7.0	53.0
fraktur of other parts of bony thorax	1	1.0	1.0	54.0
fraktur of other parts of femur	3	3.0	3.0	57.0
fraktur of other parts of forearm	2	2.0	2.0	59.0
fraktur of other parts of lower leg	2	2.0	2.0	61.0
fraktur of other toe	5	5.0	5.0	66.0
fraktur of patella	2	2.0	2.0	68.0
fraktur of rib	1	1.0	1.0	69.0
fraktur of shaft of humerus	2	2.0	2.0	71.0
fraktur of shaft of radius	13	13.0	13.0	84.0
fraktur of shaft of tibia	4	4.0	4.0	88.0
fraktur of shaft of ulna	3	3.0	3.0	91.0
fraktur of tibia fibula	1	1.0	1.0	92.0
fraktur of upper end of humerus	1	1.0	1.0	93.0
fraktur of upper end of radius	1	1.0	1.0	94.0
fraktur of upper end of tibia	1	1.0	1.0	95.0
fraktur of upper end of ulna	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

### 3. Golongan obat analgesik yang digunakan pasien fraktur

#### 1) Frekuensi jenis golongan obat analgesik pada bulan pertama

<b>Golongan obat analgesik</b>					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	analgesik opioid	17	14.8	14.8	14.8
	analgesik non opioid	98	85.2	85.2	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

## 2) Frekuensi jenis golongan obat analgesik pada bulan kedua

**Golongan obat analgesik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	analgesik opioid	11	9.6	9.6	9.6
	analgesik non opioid	104	90.4	90.4	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

## 3) Frekuensi jenis golongan obat analgesik pada bulan ketiga

**Golongan obat analgesik**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	analgesik opioid	7	6.4	6.4	6.4
	analgesik non opioid	103	93.6	93.6	100.0
	Total	110	100.0	100.0	

## 4. Jenis zat aktif analgesik yang diresepkan pada pasien fraktur

## 1) Frekuensi jenis zat aktif yang diresepkan bulan pertama

**Jenis zat aktif diresepkan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	asam mefenamat 500 mg	22	19.1	19.1	19.1
	dexketoprofen 25 mg	17	14.8	14.8	33.9
	etoricoxib 60 mg	4	3.5	3.5	37.4
	etoricoxib 90 mg	15	13.0	13.0	50.4
	ibuprofen 400 mg	2	1.7	1.7	52.2
	ketorolac 10 mg	1	.9	.9	53.0
	meloxicam 7,5 mg	27	23.5	23.5	76.5
	paracetamol 500 mg	10	8.7	8.7	85.2
	tramadol 50 mg	17	14.8	14.8	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

## 2) Frekuensi jenis zat aktif analgesik yang diresepkan bulan kedua

**Jenis zat aktif yang diresepkan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	asam mefenamat 500 mg	20	17.4	17.4	17.4
	dexketoprofen 25 mg	14	12.2	12.2	29.6
	etoricoxib 120 mg	1	.9	.9	30.4
	etoricoxib 90 mg	24	20.9	20.9	51.3
	ibuprofen 400 mg	1	.9	.9	52.2
	ketoprofen 100 mg	1	.9	.9	53.0
	ketorolac 10 mg	1	.9	.9	53.9
	meloxicam 15 mg	2	1.7	1.7	55.7
	meloxicam 7,5 mg	33	28.7	28.7	84.3
	paracetamol 500 mg	7	6.1	6.1	90.4

**Jenis zat aktif yang diresepkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
tramadol 50 mg	11	9.6	9.6	100.0
Total	115	100.0	100.0	

## 3) Frekuensi jenis zat aktif analgesik yang diresepkan bulan ketiga

**Jenis zat aktif yang diresepkan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid asam mefenamat 500 mg	27	24.5	24.5	24.5
dexketoprofen 25 mg	12	10.9	10.9	35.5
etoricoxib 60 mg	1	.9	.9	36.4
etoricoxib 90 mg	22	20.0	20.0	56.4
ibuprofen 400 mg	1	.9	.9	57.3
kalium diklofenak 50 mg	2	1.8	1.8	59.1
meloxicam 7,5 mg	31	28.2	28.2	87.3
natrium diklofenak 25 mg	1	.9	.9	88.2
paracetamol 500 mg	6	5.5	5.5	93.6
tramadol 50 mg	7	6.4	6.4	100.0
Total	110	100.0	100.0	

## 5. Penggunaan analgesik yang diresepkan pada pasien fraktur

## 1) Frekuensi penggunaan analgesik yang diresepkan bulan pertama

**Kombinasi analgesik yang digunakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tunggal	88	88.0	88.0	88.0
kombinasi	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## 2) Frekuensi penggunaan analgesik yang diresepkan bulan kedua

**Kombinasi analgesik yang digunakan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tunggal	92	92.0	92.0	92.0
kombinasi	8	8.0	8.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

## 3) Frekuensi penggunaan analgesik yang diresepkan bulan ketiga

**Kombinasi analgesik yang digunakan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tunggal	94	94.0	94.0	94.0
	kombinasi	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## 6. Bentuk sediaan analgesik yang digunakan pada pasien fraktur

## 1) Frekuensi bentuk sediaan yang digunakan bulan pertama

**Bentuk sediaan yang digunakan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tablet	88	83.8	83.8	83.8
	kapsul	11	10.5	10.5	94.3
	racikan kapsul	6	5.7	5.7	100.0
	Total	105	100.0	100.0	

## 2) Frekuensi bentuk sediaan yang digunakan bulan kedua

**Bentuk sediaan yang digunakan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tablet	97	91.5	91.5	91.5
	kapsul	4	3.8	3.8	95.3
	racikan kapsul	5	4.7	4.7	100.0
	Total	106	100.0	100.0	

## 3) Frekuensi bentuk sediaan yang digunakan bulan ketiga

**Bentuk sediaan yang digunakan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tablet	98	94.2	94.2	94.2
	kapsul	3	2.9	2.9	97.1
	racikan kapsul	3	2.9	2.9	100.0
	Total	104	100.0	100.0	

## 7. Ketepatan dosis analgesik yang digunakan pada pasien fraktur

## 1) Frekuensi ketepatan dosis analgesik yang digunakan bulan pertama

**Dosis yang diberikan pada pasien**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sesuai	99	99.0	99.0	99.0
	tidak sesuai	1	1.0	1.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## 2) Frekuensi ketepatan dosis analgesik yang digunakan bulan kedua

		Dosis yang diberikan pada pasien			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	sesuai	98	98.0	98.0	98.0
	tidak sesuai	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## 3) Frekuensi ketepatan dosis analgesik yang digunakan pada bulan ketiga

		Dosis yang diberikan pada pasien			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	sesuai	98	98.0	98.0	98.0
	tidak sesuai	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## 8. Penyesuaian dosis analgesik yang diresepkan selama masa pengobatan

No	Penyesuaian dosis analgesik yang diberikan	Frekuensi	Persentase %
1	Tidak ada penyesuaian dosis selama masa pengobatan	116	116
2	Penurunan dosis, aturan pakai tetap	7	7
3	Penambahan dosis, aturan pakai tetap	6	6
4	Dosis sekali pakai tetap, aturan pakai dikurangi	8	8
5	Obat dengan perubahan zat aktif selama masa pengobatan	64	64
<b>Total</b>		<b>201</b>	<b>201</b>

## 9. Obat penyerta yang diberikan pada pasien fraktur

## 1) Frekuensi obat penyerta yang diberikan bulan pertama

		Obat penyerta			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	antasida	1	1.1	1.1	1.1
	calcitriol 0,5mcg	2	2.1	2.1	3.2
	calcium lactat 500mg	3	3.2	3.2	6.4
	calitoz 500mg	15	16.0	16.0	22.3
	cefadroxil 500mg	5	5.3	5.3	27.7
	ciprofloxacin 500mg	1	1.1	1.1	28.7
	dexamethasone 0.5mg	1	1.1	1.1	29.8
	eperisone 50mg	1	1.1	1.1	30.9
	lansoprazole 30mg	5	5.3	5.3	36.2
	mecobalamin 250mg	1	1.1	1.1	37.2
	metilprednisolon 4mg	1	1.1	1.1	38.3

nutriflam 260mg	1	1.1	1.1	39.4
omeprazole 20mg	12	12.8	12.8	52.1
ossopan 800mg	38	40.4	40.4	92.6
pantoprazole 20mg	1	1.1	1.1	93.6
proclozam 10mg	1	1.1	1.1	94.7
relaxon 50mg	1	1.1	1.1	95.7
vitamin b com	1	1.1	1.1	96.8
vitamin b12	3	3.2	3.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

## 2) Frekuensi obat penyerta yang diberikan bulan kedua

		Obat penyerta			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	calcitriol 0,5mcg	2	2.1	2.1	2.1
	calcium lactat 500mg	2	2.1	2.1	4.2
	calitoz 500mg	23	24.2	24.2	28.4
	cefadroxil 500mg	3	3.2	3.2	31.6
	eperisone 10mg	1	1.1	1.1	32.6
	eperisone 50mg	3	3.2	3.2	35.8
	lansoprazole 30mg	6	6.3	6.3	42.1
	metil prednisolon 4mg	1	1.1	1.1	43.2
	omeprazole 20mg	10	10.5	10.5	53.7
	ondansetron 4mg	1	1.1	1.1	54.7
	ossopan 800mg	40	42.1	42.1	96.8
	pantoprazole 20mg	1	1.1	1.1	97.9
	proclozam 10mg	1	1.1	1.1	98.9
	sanmol 650mg	1	1.1	1.1	100.0
	Total	95	100.0	100.0	

## 3) Frekuensi obat penyerta yang diberikan bulan ketiga

		Obat penyerta			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	calcitriol 0,5mcg	2	2.4	2.4	2.4
	calitoz 500mg	26	31.0	31.0	33.3
	cefadroxil 500mg	1	1.2	1.2	34.5
	eperisone 10mg	1	1.2	1.2	35.7
	eperisone 50mg	1	1.2	1.2	36.9
	lansoprazole 30mg	10	11.9	11.9	48.8
	metil prednisolon 4 mg	1	1.2	1.2	50.0
	omeprazole 20mg	8	9.5	9.5	59.5
	ossopan 800mg	30	35.7	35.7	95.2
	paracetamol 500mg	1	1.2	1.2	96.4
	relaxon 50mg	2	2.4	2.4	98.8
	zypras 0,25mg	1	1.2	1.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	