

# pengaruh Murotal AL Quran Terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Post Oprasi Sectio Caesarea.

*by* Al Murhan

---

**Submission date:** 20-Apr-2022 07:41AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1814972276

**File name:** dap\_Intensitas\_Nyeri\_pada\_Pasien\_Post\_Oprasi\_Sectio\_Caesarea.pdf (325.71K)

**Word count:** 3153

**Character count:** 19876

# PENELITIAN

## PENGARUH MUROTTAL AL-QUR'AN TERHADAP INTENSITAS NYERI PADA PASIEN POST OPERASI *SECTIO CAESAREA*

Khairun Nuhan\*, Titi Astuti\*, Al Murhan\*

\*Jurusan Keperawatan Poltekkes Tanjungkarang

Prevalensi persalinan *sectio caesarea* di Indonesia menurut WHO pada tahun 2015 adalah 15,3%. Pada pasien post operasi *sectio caesarea* setelah anestesi menghilang pasien akan merasakan nyeri, sehingga diperlukan terapi yang efektif dan aman dari efek samping. Terapi Al-Qur'an salah satu bentuk teknik distraksi (pengalihan) secara non farmakologi untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan. Keberhasilan menggunakan murottal 70 % dari penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan desain *quasi experiment* dengan pendekatan *nonrandomized control grup pretest postests design*. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling* sebanyak 22 responden (1 responden kelompok perlakuan dan 11 responden kelompok kontrol). Pengumpulan data nyeri menggunakan instrumen *Numeric Rating Scale* (NRS). Uji statistik menggunakan Wilcoxon dan Mann-Whitney. Hasil penelitian terdapat perbedaan pengaruh terapi murottal Al-Qur'an terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol  $p$ -value  $< 0,01$ . Peneliti menyarankan agar pihak RS mempertimbangkan menggunakan terapi komplementer murottal Al-Qur'an untuk mempersiapkan ibu menghadapi operasi SC menggunakan SOP yang ada.

**Kata Kunci:** Nyeri, Post SC, Terapi Murottal Al-Qur'an

18

### LATAR BELAKANG

Menurut *World Health Organization* (WHO) standar rata-rata *Sectio Caesarea* (SC) adalah sekitar 5-15% per 1.000 kelahiran di dunia. Rumah sakit pemerintahan kira-kira 11% sementara di rumah sakit swasta bisa lebih dari 30%. Peningkatan persalinan dengan *Sectio Caesarea* (SC) di seluruh Negara selama tahun 2007-2008 yaitu 110.000 per kelahiran di seluruh Asia (Gibson L. et al, 2010 dalam Sumelung, Kundre, dan Karundeng, 2014: 2). Survei Global Kesehatan oleh WHO (2013) yang dituliskan dalam data statistik kesehatan dunia menyebutkan bahwa angka kejadian SC terbesar terdapat pada wilayah Amerika (36%), wilayah Western Pasifik (24%) dan wilayah Eropa (23%). Data statistik WHO (2013) juga menyebutkan bahwa negara tertinggi dengan kejadian SC terdapat pada negara Brazil (52%), Cyprus (51%), Mexico (39%).

WHO tahun 2015 selama hampir 30 tahun tingkat persalinan dengan SC menjadi 10% sampai 15% dari semua

proses persalinan di Negara-negara berkembang. RISKESDAS tahun 2013 tingkat persalinan *sectio caesarea* di Indonesia sudah melewati batas maksimal standar WHO 5-15%. Tingkat persalinan *sectio caesarea* di Indonesia 15,3% sampel dari 20.591 ibu yang melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang di survey dari 33 provinsi. Gambaran adanya faktor resiko ibu saat melahirkan atau di operasi *caesarea* adalah 13,4 % karena ketuban pecah dini, 5,49% karena *Preeklampsia*, 5,14% karena Perdarahan, 4,40% Kelainan letak Janin, 4,25% karena jalan lahir tertutup, 2,3% karena rupture uteri (Kemkes, 2014).

Tindakan operasi menyebabkan terjadinya perubahan kontinuitas jaringan tubuh. Pada proses operasi digunakan anestesi agar pasien tidak merasakan nyeri pada saat dibedah. Namun setelah operasi selesai dan pasien mulai sadar, ia akan merasakan nyeri pada bagian tubuh yang mengalami pembedahan. Nyeri yang dirasakan ibu post operasi *Sectio Caesarea* berasal dari luka yang terdapat dari perut (Sjamsuhidajat, 2005). Tidak

ada dua individu mengalami nyeri yang sama dan tidak ada dua kejadian nyeri yang sama menghasilkan sensasi nyeri atau respon nyeri yang identik sama pada seorang individu karena nyeri bersifat subjektif (Perry & Potter, 2010). Salah satu gejala yang paling sedikit dipahami padahal nyeri merupakan gejala yang paling sering terjadi di bidang medis, oleh karena itu peran perawat sangat diperlukan untuk membantu klien dan anggota keluarga dalam upaya mengatasi nyeri. Penting juga perawat memahami makna nyeri secara holistik pada setiap individu sehingga dapat mengembangkan strategi penatalaksanaan nyeri selain pemberian analgetik yaitu terapi non farmakologi.

Penatalaksanaan nyeri di bagi menjadi dua yaitu dengan farmakologi dan nonfarmakologi. Penatalaksanaan nonfarmakologis terdiri dari berbagai tindakan mencakup intervensi perilaku kognitif menggunakan agen-agen fisik meliputi stimulus kulit, stimulus elektrik saraf kulit (*transcutaneous electrical nerve stimulation/ TENS*), akupunktur dan pemberian *placebo*. Intervensi perilaku kognitif meliputi tindakan distraksi, tehnik relaksasi, imajinasi terbimbing, umpan balik biologis (*biofeedback*), *hypnosis* dan sentuhan terapeutik (Potter & Perry, 2006). Teknik distraksi sangat efektif digunakan untuk mengalihkan nyeri, hal ini disebabkan karena distraksi merupakan metode dalam upaya untuk mengurangi nyeri dan sering membuat pasien lebih menahan nyerinya. Salah satu teknik distraksi yang efektif adalah terapi murrotal Al-Qur'an, yang dapat menurunkan nyeri fisiologis, stress, dan kecemasan dengan mengalihkan perhatian seseorang dari nyeri (Potter & Perry, 2006). Murrotal yang di gunakan memakai Surah Al-Kahf beserta terjemahnya yang berisi 110 ayat karena dapat memberikan ketenangan dan menurunkan rasa nyeri (Elzaky: 2014). Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai ahli seperti yang telah dilakukan Ahmad Al Khadi direktur utama *Islamic Medicine Institute for Education and Research* di Florida, Amerika Serikat. Dalam konferensi tahunan ke XVII Ikatan

Dokter Amerika, dengan hasil penelitian bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh alat berbasis komputer (Remolda, 2009). Musik (murrotal Al-Qur'an) yang dapat menurunkan nyeri fisiologis, stress, dan kecemasan dengan mengalihkan perhatian seseorang dari nyeri. Murrotal Al-Qur'an terbukti menunjukkan efek yaitu menurunkan frekuensi denyut jantung, mengurangi kecemasan dan depresi, menghilangkan nyeri menurunkan tekanan darah, dan mengubah persepsi waktu (Elzaky, 2014). Murrotal menghasilkan perubahan status kesadaran melalui bunyi, kesunyian, ruang dan waktu. Murrotal harus didengar minimal 15 menit supaya dapat memberikan hasil efek terapeutik. Di keadaan perawatan akut, mendengarkan murrotal dapat memberikan hasil yang sangat efektif dalam upaya mengurangi nyeri pasca operasi klien (Potter & Perry, 2006). Tetapi pada kenyataannya, masih sedikit rumah sakit yang menggunakan metode nonfarmakologi dalam penatalaksanaan nyeri salah satunya terapi murrotal. Mereka lebih menitikberatkan penatalaksanaan nyeri dengan metode farmakologis salah satunya pemberian analgetik terutama pada pasien pasca operasi ([www.ipmg-online.com](http://www.ipmg-online.com) edisi 7 September 2011). Seperti yang kita ketahui bahwa pemberian analgetik secara berkelanjutan, tidak sesuai dengan aturan dan monitor yang tepat akan menimbulkan ketergantungan (Sulistyo, 2012).

Berdasarkan hasil pre-survey peneliti pada bulan April 2017, di RSUD Jendral Ahmad Yani Metro tahun 2016 yaitu jumlah persalinan 949 orang, dengan tindakan SC 28,24 % faktor penyebabnya 42,91 % akibat *pre eklampsi*, 1,26% akibat *eklampsi*, 1,11% akibat *Infeksi*, 11,94 % akibat *ketuban pecah dini*, 16,41 % akibat *perdarahan*.

Hasil wawancara didapatkan data dari ibu pasca *sectio caesarea*, ibu mengatakan nyeri mulai terasa ketika obat bius (anestesi) hilang, nyeri yang hebat

saat bergerak, nyeri terasa seperti tersayat-sayat, ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan daerah luka insisi. Ibu mengatakan untuk mengurangi rasa nyeri dengan cara beristirahat dan melakukan tarik napas dalam yang sudah diajarkan oleh bidan. Hasil wawancara peneliti pada bidan ruang bersalin untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* diberikan obat analgetik Keterolac Thromethanine 30 mg dalam Ringer Laktat 500 mg/ 8 jam atau diberikan obat sub suprafenid /8 jam. Selain obat analgetik diajarkan mobilisasi untuk mempercepat penyembuhan luka insisi.

Penelitian Rohf<sup>20</sup> (2014), yang meneliti tentang "Pengaruh Terapi Murrotal Al-Qur'an Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Dan Kecemasan Persalinan Primigravida Kala I Fase Aktif di RSUD Prof. DR. Margono Soekardjo Tahun 2014". Hasil peneliti<sup>31</sup> ada perbedaan yang signifikan pada intensitas nyeri sebelum terapi murrotal adalah 6,57. Rata-rata setelah dilakukan terapi murrotal adalah 4,93. Hasil analisis perbedaan  $M = 1,64$ <sup>22</sup> dan perbedaan  $SD = 0,821$  ( $p=0,000$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan skala nyeri sebelum dan sesudah dilak<sup>28</sup>an terapi murrotal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian distraksi murrotal Al-Qur'an efektif menurunkan intensitas nyeri persalinan kala I.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain<sup>25</sup> penelitian ini menggunakan *Quasi Experiment*, rancangan penelitian menggunakan *non equivalentwith Control Group*. Populasi dalam penelitian ini adalah 7-luruh ibu yang menjalani persalinan operasi *Sectio Caesarea* (SC) se<sup>47</sup>h 6 jam operasi dan dirawat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan cara *accidental sampling* dengan pengambilan sampel untuk masing-masing kelompok

adalah 10 kelompok untuk kelompok perlakuan dan 10 kelompok untuk kelompok kontrol.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Menilai intensitas nyeri peneliti menggunakan alat ukur (instrumen) lembar NRS dengan rentang skala nyeri 0-10. Alat yang digunakan Mp3 dan headset yang berisi murrotal Al-Qur'an Surat Al-Kahf dengan *qori* Muhammad Taha Al-Junayd. Bahan untuk penilaian respon intensitas nyeri yang dipilih yaitu menggunakan skala penilaian *Numerical rating scale*, (NRS) dengan menggunakan skala 0-10. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu peneliti bersama responden mengisi lembar *numeric scale rating* pada responden post *sectio caesarea* setelah 6 jam post operasi, melakukan penilaian intensitas nyeri pada responden yang telah 3 jam diberikan analgetik sesuai standar tindakan.

Kemudian peneliti melakukan terapi murrotal Al-Qur'an selama 15 menit pada kelompok perlakuan, setelah itu peneliti mengkaji ulang intensitas nyeri responden<sup>33</sup>ngan lembar *numeric scale rating*. Terapi murrotal Al-Qur'an pada kelompok perlakuan dilakukan 2 kali dalam rentang waktu 30 menit kemudian. Pada kelompok kontrol peneliti bersama responden mengisi lembar *numeric scale rating* pada responden post *sectio caesarea* setelah 6 jam post operasi, melakukan penilaian intensitas nyeri pada responden yang telah 3 jam diberikan analgetik sesuai standar tindakan. Penilaian intensitas nyeri pada kelompok kontrol dilakukan pretest dan posttest dalam rentang waktu 30 menit kemudian.

Hasil uji normalitas data menggunakan metode analitik parameter Shapiro-Wilk hasil data abnormal, sehingga analisis<sup>59</sup> data menggunakan uji non parametrik Uji *Wilcoxon* dan Uji *Mann-Withney*.

**HASIL**

**Analisis Univariat**

Tabel 1: Distribusi Rata-rata Intensitas Nyeri Sebelum dan Sesudah Diberikan Terapi Murottal Al-Qur'an pada Kelompok Intervensi

Intensitas Nyeri	Nyeri post Sectio Caesarea			
	Mean	Med	SD	Min-Max
Sebelum	6.82	7.00	0.603	6-8
Sesudah	3.55	3.00	0.688	3-5

Dari tabel di atas didapatkan bahwa hasil pengukuran rata-rata intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sebelum diberikan terapi murottal Al-Qur'an pada kelompok perlakuan adalah mean 6.82 dengan standar deviasi 0.603, derajat nyeri terendah adalah 6 dan derajat nyeri tertinggi adalah 8. Pengukuran rata-rata intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sesudah diberikan terapi murottal Al-Qur'an kelompok perlakuan adalah mean 3.55 dengan standar deviasi 0.688, derajat nyeri terendah adalah 3 dan derajat nyeri tertinggi adalah 5.

Tabel 2: Distribusi Rata-rata Intensitas Nyeri Sebelum dan Sesudah Diberikan Terapi Murottal Al-Qur'an pada Kelompok Kontrol

Intensitas Nyeri	Nyeri post Sectio Caesarea			
	Mean	Med	SD	Min-Max
Sebelum	6.64	7.00	0.674	6-8
Sesudah	4.91	5.00	0.701	4-6

Dari tabel di atas didapatkan bahwa hasil pengukuran rata-rata intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sebelum diberikan terapi murottal Al-Qur'an pada kelompok kontrol adalah mean 6.64 dengan standar deviasi 0.674, derajat nyeri terendah adalah 6 dan derajat nyeri tertinggi adalah 8. Pengukuran rata-rata intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sesudah diberikan terapi murottal Al-Qur'an pada kelompok kontrol adalah mean 4.91 dengan standar deviasi 0.701,

derajat nyeri terendah adalah 4 dan derajat nyeri tertinggi adalah 6.

**Analisis Bivariat**

Tabel 3: Distribusi Analisis Perbedaan Intensitas Nyeri Sebelum dan Sesudah Diberikan Terapi Murottal Al-Qur'an pada Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol

Kelompok	Nyeri post Sectio Caesarea		
	Mean	SD	p-value
Kontrol	1.73	0.647	0.003
Intervensi	3.27	0.457	0.002

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan selisih penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sebelum dan sesudah diberikan murottal Al-Qur'an pada kelompok perlakuan adalah mean 3.27 dengan standar deviasi 0.457 dan perbedaan selisih penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sebelum dan sesudah diberikan murottal Al-Qur'an pada kelompok kontrol adalah mean 1.73 dengan standar deviasi 0.647. Hasil uji Wilcoxon kelompok perlakuan didapatkan p-value 0.002 ( $p\text{-value} < 0.05$ ) yang artinya ada perbedaan penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sebelum dan sesudah diperdengarkan murottal pada kelompok perlakuan sedangkan kelompok kontrol didapatkan p-value 0.003 ( $p\text{-value} < 0.05$ ) yang artinya ada perbedaan penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC sebelum dan sesudah diperdengarkan murottal pada kelompok kontrol.

Tabel 4: Distribusi Analisis Perbedaan Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Kelompok Perlakuan dan Kontrol

Kelompok	Nyeri post Sectio Caesarea		
	n	Mean	p-value
Perlakuan-Kontrol	22	1.54	0.001

Tabel di atas menunjukkan nilai berdasarkan<sup>49</sup> hasil uji *Mann-Withney* signifikan sebesar  $0.001 < 0.05$ , berarti ada perbedaan signifikan pengukuran data kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga dapat diartikan ada perbedaan pengaruh terapi murottal Al-Qur'an terhadap penurunan intensitas<sup>27</sup> nyeri pada pasien post operasi SC pada kelompok perlakuan dan kontrol.

## PEMBAHASAN

<sup>5</sup> Perbedaan Pengaruh Terapi Murrotal Al-Qur'an Terhadap Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi  *Sectio Caesarea* (SC) Pada Kelompok Perlakuan Dan Kelompok Kontrol.

*P-value* 0.001 ( $p\text{-value} < 0.05$ ) yang artinya ada perbedaan<sup>5</sup> yang signifikan pengaruh terapi murottal Al-Qur'an terhadap penurunan intensitas nyeri<sup>56</sup> pada pasien post operasi *sectio caesarea* pada kelompok perlakuan dan kontrol.

Kelompok perlakuan dari penelitian ini<sup>12</sup> mendapatkan terapi standar analgetik dan diberikan terapi mur<sup>14</sup>ottal Al-Qur'an. Mekanisme murottal menurunkan nyeri sebagaimana dijelaskan dalam teori *Gate Control* dimana impuls musik (murottal) yang berkompetisi mencapai korteks serebri bersamaan dengan impuls nyeri akan berefek pada distraksi kognitif dalam inhibisi persepsi<sup>38</sup> (Potter & Perry, 2010). Murottal merupakan salah satu musik yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya (Widayarti, 2011).

Al-Qur'an mengandung kualitas nada huruf yang bervariasi yang dipadukan oleh Allah SWT., sehingga bila dibaca akan terasa keindahannya. Oleh karena itu Al-Qur'an bila dibaca dengan baik dan benar, maka akan memberikan efek sebagaimana musik dan lagu. Susunan huruf, kata-kata dan bunyi huruf Al-Qur'an sesuai dengan susunan syaraf dalam tubuh manusia sehingga setiap bunyi huruf Al-Qur'an yang dilontarkan akan direspon secara positif oleh urat syaraf. Gelombang alunan nada-nadanya amat indah dan selalu menyita perhatian

pendengar, tak seorang pun yang mampu membuat sastra yang keindahan dan keteraturan melebihi Al-Qur'an (Elzaky, 2014).

Karakteristik surah Al-Kahf yang dilantunkan oleh Muhammad Taha Al-Junayd mempunyai *timbre medium*, *pitch 44 Hz*, *harmony regular* dan *consistent*, *rhythm andate* (mendayu-dayu), volume<sup>21</sup> decibel, intensitas medium amplitude. Pada pitch yang rendah dengan rythm yang lambat dan volume yang rendah akan menimbulkan efek rileks. Frekuensi yang telah terbukti untuk mengurangi nyeri pasca operasi dan m<sup>11</sup>imbulkan efek tenang adalah 40-60 Db. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam auditoris therapy (terapi pendengaran) supaya dapat memberikan efek terapeutik adalah minimal selama 15 menit (Wirakhmi, 2016)<sup>17</sup>

Mendengarkan Al-Qur'an akan memberikan efek ketenangan dalam tubuh sebab adanya unsur meditasi autosugesti dan relaksasi. Rasa tenang ini akan memberikan respon emosi positif yang sangat berpengaruh dalam mendat<sup>10</sup>an persepsi positif. Persepsi positif yang didapat dari murrotal selanjutnya akan merangsang hipotalamus untuk<sup>10</sup>ngeluarkan hormone endorpin, selanjutnya amigdala akan merangsang pengaktifan sekaligus pengendalian saraf otonom yang terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis berfungsi untuk mempersarafi jantung dan memperlambat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatis sebaliknya. Rangsangan saraf otonom yang terkendali akan menyebabkan se<sup>25</sup>psi epinefrin dan norepinefrin akan menghambat pembentukan angiotensin yang selanjutnya dapat menurunkan darah (Wirakhmi, 2016)<sup>44</sup>

Sesuai dengan teori *gate control* yang dikemukakan oleh Melzack dan Wall bahwa impuls nyeri dihambat saat se<sup>53</sup>ah pertahanan ditutup, sehingga dapat menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan. Hal ini menyatakan bahwa distraksi akan merangsang keluarnya hormone *enkefalin*, *serotonin* dan

42  
*endorphin*. Enkefalin dianggap dapat menimbulkan hambatan presinaptik dan hambatan pasca sinaptik pada serabut-serabut nyeri tipe C dan tipe delta A dimana mereka bersinaps di kornu dorsalis. Proses tersebut mencapai inhibisi dengan penghambatan saluran kalsium. Penghambatan nyeri tersebut yaitu dengan memblokir reseptor nyeri sehingga nyeri tidak dikirim ke korteks selebritas dan selanjutnya akan menurunkan persepsi nyeri.

Suatu keseimbangan aktivitas dari neuron sensori dan serabut kontrol desenden dari otak mengatur proses pertahanan. Neuron delta-A dan C melepaskan substansi P untuk mentransmisi impuls melalui mekanisme pertahanan. Selain itu, terdapat mekanoreseptor, neuron beta-A yang lebih tebal, yang lebih cepat yang melepaskan neurotransmitter penghambat. Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut beta-A, akan menutup mekanisme pertahanan.

Mekanisme pentupan ini diyakini dapat terlihat saat seorang perawat menggosok punggung klien dengan lembut. Pesan yang dihasilkan akan menstimulasi mekanoreseptor, apabila masukan yang dominan berasal dari serabut delta-A dan serabut C maka akan membuka pertahanan tersebut dan akan mempersepsikan sensasi nyeri. Bahkan, jika impuls nyeri dihantarkan ke otak, terdapat pusat kortek yang lebih tinggi di otak yang memodifikasi nyeri. Alur saraf desenden melepaskan opiate endogen, seperti *endorphine* dan *dinorfin*, suatu pembunuh nyeri alami yang berasal dari tubuh. Neuromodulator ini menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat pelepasan substansi P. Teknik distraksi merupakan upaya untuk melepaskan *endorphine* (Potter & Perry, 2006).

Pada penelitian sesuai dengan keadaan di Ruang Bersalin RSUD Jendral Ahmad Yani Metro, beberapa responden mengeluh sangat nyeri karena baru pertama kali melakukan SC dan pertama kali merasakan nyeri hebat seperti

ini. Rata-rata usia yang lebih muda merasakan nyeri nya lebih besar dibandingkan dengan usianya lebih tua. Hal itu karena intensitas nyeri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia dan kebudayaan.

11  
Penelitian Wirakhmi (2016) Pengaruh Terapi Murottal Ar Rahman Pada Pasien Pasca Operasi *Sectio Caesarea* Di RSUD Dr. R. Goeteng Tarunadibrat Purbalingga. Hasil penelitian 46 menunjukkan ada perbedaan bermakna tekanan darah antara sebelum dan sesudah perlakuan pada kedua kelompok ( $p$  sistole 0,003;  $p$  diastole 0,018), tetapi frekuensi nadi dan pernapasan tidak menunjukkan perbedaan bermakna dengan nilai  $p$  berurutan (0,429;0,666). Disimpulkan bahwa ada pengaruh murottal Ar Rahman terhadap penurunan tekanan darah pasien pasca operasi *sectio caesarea* tetapi tidak demikian pada penurunan frekuensi nadi dan pernapasan.

Penelitian Yusnita (2016) Pengaruh Terapi Musik Manajemen Nyeri Pada Post Operasi *Sectio Caesarea* Di Ruang Delima RSUD Pasar Rebo. Hasil penelitian ( $P$  value = 0,002;  $\alpha$  = 0,05). Ada pengaruh terapi musik terhadap manajemen nyeri pada pasien post operasi *Sectio Caesarea*

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh murottal Al-Qur'an terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC di Ruang Bersalin RSUD Jendral Ahmad Yani Metro. Perbedaan ini terjadi karena setelah diperdengarkan murottal Al-Qur'an terjadi penurunan derajat intensitas nyeri dengan tidak diperdengarkan Al-Qur'an adalah mean 1.54. Murottal Al-Qur'an merupakan salah satu teknik distraksi non medis yang dapat memperbaiki intensitas nyeri pada pasien post operasi SC.

## KESIMPULAN

26 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan intensitas nyeri sebelum dan

sesudah diberikan terapi murrotal pada kelompok perlakuan ( $p$ -value 0.002) dan terdapat perbedaan penurunan intensitas nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi murrotal pada kelompok control ( $p$ -value 0.003).

Hasil analisis perbedaan pada keloman control disimpulkan bahwa terdapat perbedaan selisih rata-rata intensitas nyeri pada kelompok control dan kelompok perlakuan ( $p$ -value 0.001), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh terapi murrotal Al-Qur'an terhadap penurunan intensitas nyeri pada pasien post operasi SC pada kelompok control dan kelompok perlakuan. Berdasarkan angka penurunan dan nilai  $p$ -value, maka dapat disimpulkan bahwa terapi al-qur'an lebih efektif menurunkan nyeri pada pasien post operasi SC.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elzaky, Jamal. 2010. *Buku Saku Terapi Baca Al-Qur'an*. Kairo: Syuruq.
- Potter & Perry. 2010. *Fundamental of Nursing, Fundamental Keperawatan Buku 2 Edisi 7*. Jakarta: Salemba Medika.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep, Proses, dan Praktik Edisi 4*. Jakarta: EGC.
- Wirakhmi, Iki Netra & Hikmanti, Arlyana. 2016. *Pengaruh Terapi Murrotal Ar-Rahman Pada Pasien Pasca Operasi Sectio Caesarea Di RSUD Dr. R. Goeteng Runadibrata Purbalingga*. [ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/viewFile/14335](https://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/viewFile/14335).
- Yusnita, Erna. 2013. *Pengaruh Terapi Musik Terhadap Manajemen Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Di Ruang Delima RSUD Pasar Rebo Tahun 2013*. <https://ayurvedamedistra.files.wordpress.com>.

# pengaruh Murotal AL Quran Terhadap Intensitas Nyeri pada Pasien Post Oprasi Sectio Caesarea.

## ORIGINALITY REPORT

**49%**  
SIMILARITY INDEX

%  
INTERNET SOURCES

**44%**  
PUBLICATIONS

**30%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** Submitted to Sriwijaya University **6%**  
Student Paper

**2** Tari Monica Josephianney. "Pengaruh Terapi Murrotal Terhadap Kualitas Tidur Pasien Post Op Mastektomi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Provinsi Lampung", Malahayati Nursing Journal, 2021 **3%**  
Publication

**3** Alfianty Dwi Ayu Ramdhanie, Nina Yusnia. "Kejadian Preeklamsi Berat dan Kaitannya dengan Tindakan Sectio Caesarea", Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia, 2020 **3%**  
Publication

**4** Rahajeng Win Martani, Sri Mumpuni Yuniarsih. "A study of anxiety during COVID-19 outbreak among adults in Indonesia", Proceedings Series on Health & Medical Sciences, 2020 **2%**  
Publication

5

Padila Padila, Setiawati Setiawati, Iin Inayah, Henny Suzana Mediani, Chatarina Suryaningsih. "Emosi dan Hubungan Antar Sebaya pada Anak Tunalaras Usia Sekolah antara Terapi Musik Klasik (Mozart) dan Murrotal (Surah Ar-Rahman)", Jurnal Keperawatan Silampari, 2020

Publication

2%

6

Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Student Paper

2%

7

Linda Sepriliani, Nunung Mulyani, Helmi Diana. "TERAPI MUSIK TRADISIONAL KECAPI SULING SUNDA MENGATASI TINGKAT NYERI IBU POST OPERASI SECTIO CAESAREA", Media Informasi, 2018

Publication

2%

8

Yuliana Yuliana, Nikmatur Rohma. "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tenaga Kesehatan dengan Perilaku pemberian Teknik Relaksasi dan Teknik Distraksi pada Nyeri Pasien Pasca Operasi Sectio Caesarea di Rumah Sakit Baiturrahim", Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi, 2021

Publication

2%

9

Eli Muflihah, Rina Puspita Sari. "Relaksasi Terapi Otot Progresif Terhadap Penurunan Skala Nyeri Low Back Pain (LBP) Pada

1%

Pengrajin Keset", Adi Husada Nursing Journal,  
2022

Publication

---

10

Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Surabaya

Student Paper

---

1 %

11

Daryani Daryani, Wahyu Kirana, Ardi Wahyudi.  
"Pengaruh Metode Murottal Ar-Rahman  
Terhadap Kesehatan Spiritual Lanjut Usia Di  
Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia  
Dharma", Khatulistiwa Nursing Journal, 2020

Publication

---

1 %

12

Anggrayeni Purba, Anggorowati Anggorowati,  
Untung Sujianto, Muflihatul Muniroh.

"Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea  
Melalui Teknik Relaksasi Benson dan Natural  
Sounds Berbasis Audio Visual", Jurnal  
Keperawatan Silampari, 2021

Publication

---

1 %

13

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

---

1 %

14

Rohmani Rohmani, Debi Dahlia, Lestari  
Sukmarini. "PENURUNAN NYERI DENGAN  
KOMPRES DINGIN DI LEHER BELAKANG  
(TENGGUK) PADA PASIEN POST  
HEMOROIDEKTOMI TERPASANG TAMPON",  
JURNAL KEPERAWATAN TROPIS PAPUA, 2018

Publication

---

1 %

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 15 | Haifa Wahyu, Liza Fitri Lina. "Terapi Kompres Hangat dengan Aroma Jasmine Essential Oil terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Post Sectio Caesarea", Journal of Telenursing (JOTING), 2019<br>Publication | 1 % |
| 16 | Puji Astutik, Eka Kurlinawati. "Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea", STRADA JURNAL ILMIAH KESEHATAN, 2017<br>Publication                                     | 1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo<br>Student Paper   | 1 % |
| 18 | Submitted to Universitas Nasional<br>Student Paper  | 1 % |
| 19 | Siti Fadlilah, Deden Iwan Setiawan. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN NYERI TULANG BELAKANG PADA MAHASISWA KEPERAWATAN", Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2019<br>Publication                | 1 % |
| 20 | Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II<br>Student Paper   | 1 % |
| 21 | Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang<br>Student Paper  | 1 % |

---

22 Suyani Suyani, Mochammad Anwar, Herlin Fitriana Kurniawati. "Pengaruh massage counterpressure terhadap intensitas nyeri persalinan kala I fase aktif", Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah, 2018 1 %  
Publication

---

23 Wilda Nurul Fadilah, Meti Megawati, Endang Astiriyani. "PENGARUH HIPNOSIS TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU POST SECTIO CAESAREA", Media Informasi, 2018 1 %  
Publication

---

24 Yurike Septianingrum, Nety Mawarda Hatmanti, Andikawati Fitriasaki. "THE EFFECT OF MUROTTAL QUR'AN ON MENSTRUAL PAIN IN NURSING STUDENT OF UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA", Nurse and Health: Jurnal Keperawatan, 2019 1 %  
Publication

---

25 Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan 1 %  
Student Paper

---

26 Neni Rustini, Feva Tridiyawati. "Efektifitas Relaksasi Slow Deep Breathing Dan Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea", Malahayati Nursing Journal, 2022 1 %  
Publication

---

27

Siana Dondi, Aristy Rian Avinda Putri.  
"KONSUMSI TEH BAYAM MERAH SEBAGAI  
UPAYA MENINGKATKAN KADAR HB PADA IBU  
HAMIL TRIMESTER 2 (Studi di Wilayah Kerja  
Puskesmas Harapan Kabupaten Jayapura)",  
GEMA KESEHATAN, 2020

Publication

1 %

28

Sri Mulyani Nurhayati, Siti Ulfah Nurjanah.  
"Penurunan Intensitas Nyeri Persalinan Kala 1  
Fase Aktif dengan Terapi Murottal Al-Qur'an",  
Journal of Telenursing (JOTING), 2020

Publication

1 %

29

Ari Andriyani, Mahindria Vici Virahaju.  
"KOMBINASI TERAPI WARNA HIJAU,  
AROMATERAPI LAVENDER, DAN MUSIK  
UNTUK MENURUNKAN NYERI DAN  
KECEMASAN PERSALINAN", Media Ilmu  
Kesehata, 2019

Publication

&lt;1 %

30

Regina Vidya Trias Novita, Megawati Saragih.  
"Perbedaan Intensitas Nyeri Sebelum dan  
Sesudah Ambulasi Dini pada Ibu Postpartum  
Post Seksiosesar", DINAMIKA KESEHATAN  
JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN,  
2020

Publication

&lt;1 %

31

Submitted to IAIN Kudus

Student Paper

&lt;1 %

32

Submitted to Poltekkes Kemenkes Sorong

Student Paper

&lt;1 %

33

Ricky Riyanto Iksan, Eni Hastuti. "Terapi Murotal dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Tidur Lansia", Jurnal Keperawatan Silampari, 2020

Publication

&lt;1 %

34

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

&lt;1 %

35

Dainty Maternity. "KOMPRES PANAS DINGIN DAPAT MENGURANGI NYERI KALA I PERSALINAN DI RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2019

Publication

&lt;1 %

36

Nova Maulana. "PENGARUH TERAPI YOGA "PRANAYAMA" DAN AROMATHERAPY TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI RHEUMATOID ARTHRITIS PADA LANSIA DI PANTI WREDHA BUDHI DHARMA YOGYAKARTA 2019", Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2019

Publication

&lt;1 %

37

Siti Zuraida Muhsinin, Titih Huriah, Erfin Firmawati. "Health education video project dalam proses discharge planning meningkatkan kesiapan keluarga merawat

&lt;1 %

pasien stroke", JHeS (Journal of Health Studies), 2019

Publication

38

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

39

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1 %

40

Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Student Paper

<1 %

41

Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

<1 %

42

Maya Indriati, Dyah Triwidiyantari, Krisnasari Nur Apriyanti. "Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas dalam Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea di RSUD Cianjur", Jurnal Sehat Masada, 2018

Publication

<1 %

43

Submitted to University of Muhammadiyah Malang

Student Paper

<1 %

44

A. Ridha Al Shifa, Nur Ulmy Mahmud, Sartika Suyuti. "Pengaruh Kompres Hangat terhadap Penurunan Intensitas Dismenore pada Remaja Putri di Madrasah Aliyah DDI

<1 %

# Mangkoso Kabupaten Barru", Window of Public Health Journal, 2021

Publication

---

45

Agus Susilawati. "PENGARUH TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN SURAH AR-RAHMAN TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI PSTW BUDI LUHUR KOTA JAMBI", Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi, 2019

Publication

---

46

Erlita Kundartiari, Sri Nur Hartiningsih. "Pengaruh Terapi Relaksasi Nafas Dalam dan Murottal Terhadap Tekanan Darah", JURNAL KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES RI PANGKALPINANG, 2020

Publication

---

47

Nurya Viandika, Ratih Mega Septiasari. "Pengaruh Continuity Of Care Terhadap Angka Kejadian Sectio Cessarea", Journal for Quality in Women's Health, 2020

Publication

---

48

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

---

49

Astuti Astuti, Agus Purnama. "Pengaruh Membaca Al-Quran terhadap Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes Melitus di RSUD Cengkareng Tahun 2018", Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia, 2019

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

50

Gamma Nurul Wardah, Sigit Purwanto, Karolin Adhistry. "Pengaruh Teknik Distraksi Audio terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Proses Pemasangan Intravena Fluid Drip", Citra Delima : Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung, 2019

Publication

---

51

Rantiyana Rantiyana, Miranti Florencia, Suratun Suratun. "Pengaruh Terapi Murottal Al Qur'an Terhadap Nyeri Pada Pasien Luka Bakar", Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah, 2018

Publication

---

52

Faradilla Miftah Suranata, Agung Waluyo, Wati Jumaiyah, Dhea Natasha. "Slow Deep Breathing dan Alternate Nostril Breathing terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi", Jurnal Keperawatan Silampari, 2019

Publication

---

53

Dwi Rahayu. "Perubahan Tingkat Nyeri Pada Pasien Primigravida Inpartu Kala I Dengan Penerapan Slow Stroke Back Massage Berbasis Teori Kenyamanan Kolcaba", Jurnal Ilmu Kesehatan, 2017

Publication

---

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

54

Fitra Mayenti, Yusnita Sari. "Efektifitas Teknik Distraksi Musik Klasik Mozart Untuk Mengurangi Nyeri Pada Pasien Post Operasi Fraktur", Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi, 2020

Publication

<1 %

55

Syukriana Salam. "Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Insomnia pada Lanjut Usia di Puskesmas Usuku Wakatobi", Window of Nursing Journal, 2021

Publication

<1 %

56

Supriadin Supriadin, Agung Waluyo, Rohman Azzam. "Pengaruh Dance Movement Therapy terhadap Perubahan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi", Journal of Telenursing (JOTING), 2019

Publication

<1 %

57

Delvi Rahmayanti, Yusrah Taqiyah, Rizqy Iftitah Alam. "Pengaruh Terapi Murottal Surah Ar-Rahman terhadap Tingkat Dismenore pada Remaja", Window of Nursing Journal, 2021

Publication

<1 %

58

Egidius Umbu Ndeta. "THE TRADITIONAL MUSIC SAPE' THERAPY ON POST OPERATING PAIN SCALE REDUCTION AT SANTO VINCENTIUS HOSPITAL SINGKAWANG CITY", Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education, 2020

<1 %

59

Luki Masriansyah .. "PENGARUH TERAPI  
BRAINWAVE ENTRAINMENT DENGAN  
STIMULASI BINAURAL BEATS AUDIOTORY  
TERHADAP NYERI PADA LANSIA DENGAN  
GOUT ARTHRITIS DI WILAYAH KERJA  
PUSKESMAS ALIANYANG KOTA PONTIANAK",  
Tanjungpura Journal of Nursing Practice and  
Education, 2019

<1 %

Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off