

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah dilakukan Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir terhadap By Ny L Di Desa Sumpersari dimulai sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dan pendokumentasian secara SOAP, maka dapat di simpulkan:

1. Pengkajian

Pengkajian telah dilakukan dan didapatkan data bahwa By.Ny. L mengalami kesulitan bernafas spontan, meringis, eskremetas biru, gerakan lemah dan hasil perhitungan skor APGAR berjumlah 6 pada 2 menit pertama yang termasuk dalam asfiksia sedang.

2. *Assessment*

Masalah yang ditemukan pada subjek asuhan yaitu Asfiksia Sedang. Setelah dilakukan asuhan bayi baru lahir dengan resusitasi By Ny L terjadi perubahan berdasarkan APGAR skor yang meningkat menjadi 8, diagnosa potensial yang dapat terjadi jika bayi tidak dapat penanganan adalah asfiksia berat.

3. *Planning*

Plan atau perencanaan yang akan dilakukan setelah melakukan penilaian sepintas adalah tindakan resusitasi pada saat bayi lahir dengan menggunakan tahap awal resusitasi yaitu HAIKAL (Hangatkan, Atur posisi, Isap Lendir, Keringkan bayi, Atur posisi, Lakukan Penilaian) kemudian penilaian APGAR

kembali setelah 5 menit dan pemantauan atau observasi setiap 15 menit pada 2 jam pertama dan pemantauan perkembangan untuk mengetahui perkembangan bayi.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan adalah asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan tindakan resusitasi tahap awal yaitu HAIKAL (Hangatkan, Atur posisi Isap lendir, Keringkan bayi, Atur kembali posisi, Lakukan penilaian kembali), setelah bayi menangis dan warna kulit kemerahan selanjutnya melakukan observasi setiap 15 menit pada 2 jam pertama meliputi pemantauan keadaan umum dan tanda tanda vital untuk mengetahui keadaan baik apakah membaik atau memburuk, dan melakukan pemantauan perkembangan untuk mengetahui perkembangan bayi, pemantauan perkembangan dilakukan sebanyak 4 kali.

5. Evaluasi

Evaluasi hasil asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan kasus Asfiksia Sedang dapat disimpulkan bahwa tindakan resusitasi tahap awal HAIKAL sangat efektif dilakukan pada By Ny L sehingga bayi berhasil bernafas, warna kulit kemerahan, detak jantung normal, menangis kuat, dan gerakan aktif, dilihat dari skor APGAR yang meningkat yang semula berjumlah 6 menjadi 8 tanda tanda vital normal, bayi mau menyusu, BAK dan BAB normal.

B. Saran

1. Bagi Prodi Kebidanan Metro

Hasil asuhan kebidanan ini dapat dijadikan bahan bacaan tentang penanganan bayi dengan Asfiksia Sedang yaitu menggunakan asuhan resusitasi untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Bagi BPM

Dapat dijadikan bahan standar pelayanan yang harus diberikan mengatasi masalah pada bayi baru lahir dengan Asfiksia Sedang.