

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi berdasarkan usia paling banyak terjadi pada usia <20th / >35th yaitu sebanyak 17 orang (68,00%), dan pada usia 20-35th yaitu sebanyak 8 orang (32,00%).
2. Distribusi frekuensi berdasarkan paritas paling banyak terjadi pada primigravida yaitu sebanyak 15 orang (60,00%) dan pada Multigravida yaitu sebanyak 10 orang (40,00%).
3. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat hipertensi paling banyak terjadi pada 20 orang (80,00%) ada riwayat, dan sebanyak 5 orang (20,00%) tanpa riwayat.
4. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat penyakit tertentu paling banyak terjadi pada 22 orang (88,00%) tanpa riwayat dan 3 orang (12,00%) ada riwayat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka saran-saran yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi baru sebagai sarana informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang karakteristik ibu post partum yang mengalami preeklampsia.

2. Bagi RSUD Wisma Rini Pringsewu Lampung

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan mengenai karakteristik ibu post partum yang mengalami preeklampsia, dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang preeklampsia dan faktor-faktor terjadinya preeklampsia, juga pemeriksaan antenatal rutin bagi ibu hamil untuk mendeteksi dini terjadinya preeklampsia agar dapat mengurangi angka kejadian preeklampsia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan faktor-faktor lain tentang karakteristik ibu post partum yang mengalami preeklampsia.

