

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil karakteristik responden, usia 21 tahun merupakan usia yang paling tinggi yaitu sebanyak 35 responden (50%). Sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 87,1%.
2. Hasil karakteristik klinis menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memiliki komorbid yaitu sebanyak 97,1%. Pada saat vaksinasi, 98,6% responden dalam keadaan sehat, sebagian besar responden tidak pernah terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu sebesar 92,8% serta jenis vaksin yang paling banyak digunakan oleh responden adalah vaksin Sinovac (95,7%).
3. Sebagian besar responden mengalami KIPI yaitu sebanyak 57 responden (81,4%).
4. Berdasarkan jenis vaksin, sebagian besar responden yang mengalami KIPI menggunakan vaksin Sinovac 95,7%. Kebanyakan responden mengalami KIPI pada vaksinasi dosis pertama (61,4%).
5. Jenis KIPI yang paling sering dirasakan oleh responden adalah nyeri di daerah suntikan yaitu sebanyak 50 responden (61,7%)
6. Lama KIPI yang dialami oleh responden paling banyak adalah selama 1 hari yaitu sebanyak 38 responden (66,7%).
7. Mayoritas responden tidak melakukan terapi untuk mengurangi reaksi KIPI (82,5%). Sebanyak 10 responden yang melakukan KIPI kebanyakan melakukan terapi farmakologi dengan mengkonsumsi Paracetamol (60%) dan 40% melakukan terapi non-farmakologi menggunakan kompres air hangat.

B. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian meliputi:

1. Meneliti terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KIPI agar selanjutnya individu dapat melakukan pencegahan untuk mengurangi kejadian KIPI.
2. Meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan terapi KIPI untuk mengetahui alasan seseorang tidak melakukan terapi KIPI.