

SALMA DIANA KUMARA

GINGIVITIS PADA IBU HAMIL BERDASARKAN USIA KEHAMILAN
xiv + 35 halaman 2 tabel 8 gambar

ABSTRAK

Gingivitis adalah peradangan pada gusi (gingiva) yang ditandai dengan gusi meradang, tampak merah, membengkak, dan mudah berdarah. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (2018) prevalensi penduduk yang mempunyai masalah gigi dan mulut termasuk gingivitis di Indonesia yakni sebesar 57,6%. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gingivitis pada ibu hamil berdasarkan usia kehamilannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Kepustakaan ini didapatkan dari buku dan jurnal yang terkait dengan Gingivitis Pada Ibu Hamil berdasarkan Usia Kehamilan. Dari 2 jurnal didapatkan hasil bahwa jumlah kejadian dan derajat keparahan gingivitis pada ibu hamil meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. kejadian gingivitis pada ibu hamil dengan usia kehamilan trimester I terbanyak gingivitis ringan, pada trimester II terbanyak gingivitis sedang, dan pada trimester III terbanyak gingivitis berat dan sedang menuju berat.

Disarankan setiap ibu hamil harus memberika perhatian kepada kesehatan rongga mulutnya karna pada setiap kehamilan berisiko terjadi gingivitis..

Kata kunci : Kehamilan dan gingivitis.

Daftar Bacaan : 23 (1993-2021)

**POLYTECHNIC OF HEALTH
TANJUNGPURBA DENTAL HEALTH
DEPARTMENT**

Scientific Papers, 06 Juni 2022

SALMA DIANA KUMARA

GINGIVITIS IN PREGNANT WOMEN BY GESTATIONAL AGE

xiv + 35 pages 2 table 8 pictures

ABSTRACT

Gingivitis is inflammation of the gums (gingiva) which is characterized by inflamed gums, appearing red, swollen, and bleeding easily. Based on the Basic Health Research (2018), the prevalence of people with dental and oral problems including gingivitis in Indonesia is 57.6%. This literature study aims to determine how gingivitis in pregnant women is based on gestational age. The type of research used is Library Research. This literature study was obtained from books and journals related to Gingivitis in Pregnant Women based on Gestational Age. From 2 journals, it was found that the number of incidences and the severity of gingivitis in pregnant women increased with increasing gestational age. In the first trimester the gingivitis was mild, in the second trimester the gingivitis was moderate, and in the third trimester the gingivitis was severe and moderate to severe.

It is recommended that every pregnant woman should pay attention to the health of her oral cavity because in every pregnancy there is a risk of gingivitis

Key words : Pregnancy and gingivitis.

Reading List : 23 (1993-2021)