

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPONORO
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN METRO
Skripsi, Juli 2024

Yolla Fitri Yansyah

Hubungan Pola Asuh Keluarga dengan Kejadian Gizi Kurang pada Anak Usia 6-24 Bulan di Wilayah Puskesmas Margorejo Tahun 2024

xvi + 49 halaman + 5 tabel + 5 gambar + 17 lampiran

ABSTRAK

Periode usia lebih dari 6 bulan adalah masa rentan anak untuk mengalami permasalahan gizi. Masalah yang sering terjadi pada anak usia 0-2 tahun salah satunya adalah gizi kurang. Hasil prevalensi gizi kurang di Provinsi Lampung mengalami penurunan 0,2 %, di tahun 2021 dari 7,2% menjadi 7,0% di tahun 2022, di Kota Metro pada tahun 2021 sebesar 7,0% yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1,4 % menjadi 8,4% dan presentase terbesar berada pada Puskesmas Margorejo sebesar 10%. penyebab gizi kurang secara tidak langsung yaitu pola asuh. Tujuan penelitian untuk mengetahui Hubungan Pola Asuh Keluarga dengan Kejadian Gizi Kurang pada anak usia 6-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Margorejo.

Jenis penelitian *survei analitik* dengan pendekatan *case control*. Jumlah populasi baduta di Puskesmas Margorejo ada 264 baduta. Besar sampel ditentukan berdasarkan rumus uji hipotesis beda 2 proporsi diperoleh 22 responden. Variabel dependen: gizi kurang. Variabel independen: pola asuh keluarga. Teknik pengambilan sampel adalah *simple random sampling* dengan cara pengundian. Data dianalisis secara univariat dan bivariat dengan *chi square* dan tingkat kesalahan $\alpha=0,05$.

Hasil penelitian dari 66 responden menunjukkan pola asuh kurang baik ada 48,5% (32 responden). Berdasarkan hasil analisis diperoleh *p value* = 0,000. Menunjukkan ada hubungan pola asuh dengan kejadian gizi kurang pada anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Margorejo. Nilai OR = 15.103 yang berarti baduta dengan pola asuh kurang baik beresiko terkena gizi kurang 15.103 kali dibandingkan anak usia 6-24 bulan dengan pola asuh baik.

Simpulan dari hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Margorejo Ada hubungan pola asuh dengan kejadian gizi kurang pada anak usia 6-24 bulan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pola asuh yang tidak baik yang menjadi penyebab gizi kurang adalah memberikan motivasi dan penyuluhan mengenai gizi dan juga pola asuh kepada ibu yang memiliki anak usia 6-24 bulan sesuai dengan kemampuan ibu. Petugas juga harus dapat memastikan bahwa ibu rutin membawa anaknya untuk posyandu disetiap bulan.

Kata Kunci : Gizi Kurang, Anak usia 6-24 bulan, Pola Asuh
Daftar bacaan : 35 (2013-2024)

**TANJUNGKARANG HEALTH POLYTECHNIC
UNDERGRADUATE STUDY PROGRAM APPLIED MIDWIFERY METRO
Thesis, July 2024**

Yolla Fitri Yansyah

The Relationship between Family Parenting Patterns and the Incidence of Undernutrition in Children Aged 6-24 Months in the Margorejo Health Center Area in 2024

xvi + 49 pages + 5 tables + 5 figures + 17 attachments

ABSTRACT

The age period of more than 6 months is a vulnerable period for children to experience nutritional problems. One of the problems that often occurs in children aged 0-2 years is malnutrition. The results of the prevalence of malnutrition in Lampung Province have decreased by 0.2%, in 2021 from 7.2% to 7.0% in 2022, in Metro City in 2021 it was 7.0% which shows that in 2022 there was an increase from the previous year, namely by 1.4% to 8.4% and the largest percentage was at the Margorejo Health Center by 10%. The cause of indirect malnutrition is parenting. The purpose of the study was to determine the relationship between family parenting patterns and the incidence of malnutrition in children aged 6-24 months in the Margorejo Health Center Working Area.

Type of analytic survey research with a case control approach. The population of under-five children in Margorejo Health Center was 264 under-five children. The sample size was determined based on the formula for the hypothesis test of a difference of 2 proportions obtained 22 respondents. Dependent variable: undernutrition. Independent variable: family parenting. The sampling technique was simple random sampling by drawing lots. Data were analyzed univariate and bivariate with chi square and error rate $\alpha=0.05$.

The results of the study of 66 respondents showed poor parenting was 48.5% (32 respondents). Based on the results of the analysis obtained p value = 0.000. Indicates there is a relationship between parenting patterns and the incidence of malnutrition in children aged 6-24 months in the Margorejo Health Center work area. OR value = 15.103 which means that children with poor parenting are at risk of being malnourished 15.103 times compared to children aged 6-24 months with good parenting.

Conclusion from the results of research in the Margorejo Health Center Working Area There is a relationship between parenting patterns and the incidence of malnutrition in children aged 6-24 months. Efforts made to prevent poor parenting patterns that cause malnutrition are to provide motivation and counseling about nutrition and also parenting to mothers who have children aged 6-24 months according to the mother's ability. Officers must also be able to ensure that mothers routinely bring their children to posyandu every month.

Keywords : Undernutrition, Children aged 6-24 months, Parenting Patterns
Reading list : 35 (2013-2024)