

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan jumlah neutrofil dan limfosit dengan skala tubex 4 dan 6 pada pasien demam tifoid anak di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Distribusi Frekuensi pada jumlah neutrofil dengan skala tubex 4 didapatkan rerata sebesar 47,00%, dan skala 6 sebesar 46,75% sementara jumlah limfosit pada skala 4 didapatkan rerata sebesar 43,44% dan skala 6 didapatkan rerata sebesar 48,44%
2. Didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara skala kepositifan tubex dengan jumlah neutrofil  $p\text{-value}$  0,5225 ( $>0,05$ )
3. Didapatkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara skala kepositifan tubex dengan jumlah limfosit  $p\text{-value}$  0,7834 ( $>0,05$ )

#### **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar, analisis perbandingan sebaiknya juga mempertimbangkan variabel klinis lain seperti lama sakit, dan status pengobatan.