

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasien PJK berdasarkan usia diperoleh hasil dewasa (36-45 tahun) sebanyak 6 pasien (19%), pra lansia (46-60 tahun) sebanyak 17 pasien (53%) dan lansia (61-75 tahun) 9 pasien (28%). Pasien PJK berdasarkan jenis kelamin diperoleh hasil laki-laki sebanyak 20 pasien (63%) dan perempuan sebanyak 12 pasien (37%).
2. Rata-rata kadar PT pasien PJK didapatkan 15,9 detik, median 15,3 detik, nilai minimum 12,1 detik, dan maksimum 29,2 detik.
3. Rata-rata kadar aPTT pasien PJK didapatkan 33,4 detik, median 32,0 detik, nilai minimum 27,0 detik, dan maksimum 48,0 detik.
4. Kadar PT normal sebanyak 10 sampel (31%), sedangkan nilai PT yang memanjang sebanyak 22 sampel (69%). Kadar aPTT normal sebanyak 28 sampel (87%), sedangkan nilai aPTT yang memanjang sebanyak 4 sampel (13%).

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat melanjutkan penelitian mengenai hubungan kadar PT dan aPTT pada pasien PJK dengan berbagai faktor seperti lama menderita, dan penyakit penyerta.