

**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUSAN
KEBIDANAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
KAMPUS METRO SKRIPSI, JULI 2025**

Helvi Azaria Pitria

**KARAKTERISTIK IBU DENGAN PREEKLAMPSIA BERAT DI RUANG
KEBIDANAN RSUD AHMAD YANI TAHUN 2023 – 2024**

xvii + 37 halaman + 6 tabel + 4 gambar + 10 lampiran

RINGKASAN

Preeklampsia/eklampsia merupakan penyebab kedua terbanyak kematian ibu setelah perdarahan. Prevalensi preeklampsia/eklampsia di Negara berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan di Negara maju. *World Health Organization* memperkirakan 800 perempuan meninggal setiap harinya akibat komplikasi kehamilan dan proses kelahiran, sekitar 99% dari seluruh kematian ibu terjadi di Negara berkembang. Sekitar 80% kematian maternal merupakan akibat meningkatnya komplikasi selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan. Dampak preeklampsia pada ibu adalah eklampsia, dan sindrom *HELLP* (*Hemolysis, Elevated Liver Enzym, Low Platelet Count*) yaitu hancurnya sel darah merah, peningkatan enzim hati, dan jumlah trombosit yang rendah yang dapat menyebabkan kematian pada ibu bahkan janinnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik ibu dengan preeklampsia berat di ruang kebidanan RSUD Ahmad Yani Tahun 2023 – 2024.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain observasional dengan pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu bersalin yang didiagnosis preeklampsia berat di ruang kebidanan RSUD Ahmad Yani yang berjumlah 48 orang. Sampel pada penelitian ini adalah semua populasi yang berjumlah 48 orang. Teknik pengambilan sampel ini adalah total sampel yang berjumlah 48 orang. Pengumpulan data menggunakan *checklist*. Analisis penelitian ini menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi.

Hasil penelitian sebagai besar karakteristik ibu dengan preeklampsia berat didapatkan proporsi status gravida primigravida 29 orang (60.4%), Proporsi usia ibu >35 Tahun 25 Orang (52.1%), Proporsi usia kehamilan <37 Minggu 27 Orang (56.3%), Proporsi jenis persalinan *sectio caesarea* 43 Orang (89.6%).

Simpulan penelitian ini bahwa ibu dengan preeklampsia berat paling banyak terjadi pada kelompok Primigravida, Usia ibu >35 Tahun, , Usia kehamilan <37 minggu, dan Persalinan *Sectio caesarea*. Peneliti berharap dapat menjadi pertimbangan pertimbangan dalam membentuk program untuk mencegah terjadinya kejadian Preeklampsia berat dan dapat memberikan penatalaksanaan yang tepat terhadap kejadian Preeklampsia berat.

Kata Kunci : Preeklampsia berat, Status gravida, Usia ibu, Usia kehamilan, Jenis persalinan

Daftar Bacaan : 29 (2014 – 2024)

**TANJUNGKARANG HEALTH POLYTECHNIC DEPARTMENT
OF MIDWIFERY, BACHELOR OF APPLIED MIDWIFERY STUDY PROGRAM
METRO CAMPUS THESIS, JULY 2025**

Helvi Azaria Pitria

**CHARACTERISTICS OF MOTHERS WITH SEVERE PREECLAMPSIA IN THE
OBSTETRIC WARD OF AHMAD YANI HOSPITAL IN 2023-2024**

xvii + 37 pages + 6 tables + 4 figures + 10 appendices

SUMMARY

Preeclampsia/eclampsia is the second leading cause of maternal death after hemorrhage. The prevalence of preeclampsia/eclampsia is significantly higher in developing countries compared to developed countries. The World Health Organization estimates that 800 women die every day due to complications during pregnancy and childbirth, with about 99% of all maternal deaths occurring in developing countries. Around 80% of maternal deaths are caused by increasing complications during pregnancy, labor, and the postpartum period. The impact of preeclampsia on the mother includes eclampsia and HELLP syndrome (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count), which is characterized by the destruction of red blood cells, elevated liver enzymes, and low platelet counts—conditions that can lead to maternal and even fetal death. This study aims to examine the characteristics of mothers with severe preeclampsia in the midwifery ward of Ahmad Yani Regional Hospital in 2023–2024.

This study is a quantitative observational study with a descriptive approach. The population in this study were all 48 mothers giving birth diagnosed with severe preeclampsia in the obstetrics room of Ahmad Yani Regional Hospital. The sample in this study was the entire population, totaling 48 people. The sampling technique was a total sample of 48 people. Data collection used a checklist. This study analysis used univariate analysis to determine the frequency distribution.

The results of the study on the characteristics of mothers with severe preeclampsia showed that the proportion of primigravida status was 29 people (60.4%), the proportion of maternal age >35 years was 25 people (52.1%), the proportion of gestational age <37 weeks was 27 people (56.3%), and the proportion of caesarean section delivery was 43 people (89.6%).

The conclusion of this study is that mothers with severe preeclampsia are most often in the primigravida group, maternal age >35 years, gestational age <37 weeks, and delivery by cesarean section. Researchers hope that this can be a consideration in developing programs to prevent the occurrence of severe preeclampsia and can provide appropriate management for severe preeclampsia.

Keywords : Severe preeclampsia, Gravida status, Maternal age, Gestational age, Type of delivery

Reading List : 29 (2014–2024)