

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Kampus



Kementerian Kesehatan
Politeknik Tanjungkarang

Jl. Sriwijaya Hatta No.6 Bandar Lampung
Lampung 25145
07211 783052
<http://poltekkes-tk.lk.id>

Nomor : PP.01.04/F.XLIIV/10473/2024
Lampiran : 1 eks
Hal : Izin Penelitian

27 Desember 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)
Kabupaten Tanggamus
Di - Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Tahun Akademik 2024/2025, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1.	Lia Maulani NIM: 2248401056	Gambaran Penggunaan Obat Antinyent Untuk Swamedikasi Pada Masyarakat Di Desa Sima Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus Tahun 2025	Desa Sima Galih Kecamatan Ulubelu

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang,



Dewi Purwaningsih, S.SIT., M.Kes


Tembusan:

- 1.Ka.Jurusan Farmasi
- 2.Ka.Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
- 3.Ka.Desa Desa Sima Galih

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporan melalui HALO KENENKES 1500967 dan <http://halo.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi kesadaran instansi harus dilakukan oleh ahli ilmu, komunitas akademik, dan/atau ahli praktisi.



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dinas



Lampiran 3. Lembar *Informed Consent*

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa D3 Farmasi Politeknik

Kesehatan Tanjungkarang yang bernama Lia Maulani dengan judul

**“GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANALGESIK PADA
SWAMEDIKASI NYERI DI MASYARAKAT DESA SIRNA GALIH
KECAMATAN ULUBELU KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025”**

Saya memahami dan mengerti bahwa penelitian ini tidak berdampak buruk terhadap saya, maka dari itu saya bersedia menjadi responden peneliti.

Lampung, Januari 2025

Peneliti

Responden

(Lia Maulani)

()

Lampiran 4. Lembar kuesioner

Nama : _____

Domisili : _____

Jenis kelamin : Perempuan Laki-laki

Usia : 17-25 th 26-45 th 46-65 th

Pekerjaan : Bekerja Tidak bekerja

Alasan melakukan swamedikasi

1. Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri?

- a. Kurang puas terhadap pelayanan kesehatan
- b. Biaya lebih murah
- c. Praktis dalam segi waktu
- d. Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan
- e. Alasan lainnya, sebutkan...

Nama dagang, penggolongan, dan Kandungan zat aktif

2. Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri?

- a. Novastan (asam mefenamat)
- b. Novalgin (metamizole)
- c. Aspilets (asam asetilsalisilat)
- d. Panadol (paracetamol)
- e. Proris (ibuprofen)
- f. Lainnya, sebutkan...

Kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat

3. Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari?

- a. 1 x sehari
- b. 2 x sehari
- c. 3 x sehari
- d. 4 x sehari
- e. Lainnya, sebutkan...

4. Kapan anda meminum obat tersebut?
 - a. Sebelum makan
 - b. Sesudah makan
 - c. Lainnya, sebutkan...
5. Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan?
 - a. Menggandakan dosis di siang hari
 - b. Melewatkannya dosis yang terlewat
 - c. Lainnya, sebutkan...
6. Apakah anda rutin meminum obat tersebut?
 - a. Rutin
 - b. Jika nyeri saja
 - c. Lainnya, sebutkan...

Tempat mendapatkan obat

7. Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri?
 - a. Toko obat
 - b. Warung
 - c. Apotek
 - d. Tempat lainnya, sebutkan...

Sumber informasi untuk mendapatkan obat

8. Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri?
 - a. Tenaga Kesehatan
 - b. Media cetak (brosur, *leaflet*, poster)
 - c. Media elektronik (tv, radio, internet)
 - d. Lainnya, sebutkan...

Tindak lanjut suatu tindakan yang dilakukan responden.

9. Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri?
 - a. Ke puskesmas

- b. Ke klinik
- c. Ke rumah sakit
- d. Lainnya, sebutkan...

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Kuesioner

Correlations											
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.626**	.149	.080	.321	-.006	.092	-.183	-.027	.527**
	Sig. (2-tailed)		.000	.431	.673	.083	.976	.630	.333	.889	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.626**	1	.302	.356	.010	-.010	.156	-.065	-.003	.623**
	Sig. (2-tailed)	.000		.104	.054	.957	.959	.412	.731	.988	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.149	.302	1	.591**	.333	.477**	-.161	.343	.171	.623**
	Sig. (2-tailed)	.431	.104		.001	.072	.008	.395	.064	.366	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.080	.356	.591**	1	.024	.318	.161	.229	.191	.582**
	Sig. (2-tailed)	.673	.054	.001		.901	.087	.395	.224	.312	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.321	.010	.333	.024	1	.380*	-.063	.060	.110	.373*
	Sig. (2-tailed)	.083	.957	.072	.901		.038	.740	.754	.562	.042
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	-.006	-.010	.477**	.318	.380*	1	.060	.324	.290	.488**
	Sig. (2-tailed)	.976	.959	.008	.087	.038		.751	.081	.120	.006

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.092	.156	-.161	.161	-.063	.060	1	.293	.280	.436*
	Sig. (2-tailed)	.630	.412	.395	.395	.740	.751		.117	.134	.016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	-.183	-.065	.343	.229	.060	.324	.293	1	.287	.467**
	Sig. (2-tailed)	.333	.731	.064	.224	.754	.081	.117		.124	.009
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	-.027	-.003	.171	.191	.110	.290	.280	.287	1	.482**
	Sig. (2-tailed)	.889	.988	.366	.312	.562	.120	.134	.124		.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.527**	.623**	.623**	.582**	.373*	.488**	.436*	.467**	.482**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.001	.042	.006	.016	.009	.007	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).											

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
P1	0,527	0,361	Valid
P2	0,623	0,361	Valid
P3	0,623	0,361	Valid
P4	0,582	0,361	Valid
P5	0,373	0,361	Valid
P6	0,488	0,361	Valid
P7	0,436	0,361	Valid
P8	0,467	0,361	Valid
P9	0,482	0,361	Valid

Pengujian menggunakan software SPSS dengan jumlah sampel ($n = 30$) responden sehingga didapatkan nilai r tabel sebesar 0,361 (Sugiyono, 2011). Dari uji validitas yang telah dilakukan didapatkan hasil pertanyaan yang valid berjumlah 9 pertanyaan.

Lampiran 6. Hasil Uji Realibilitas Kuesioner

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.622	9

Uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dimana semua pertanyaan yang dinyatakan valid di uji reliabilitasnya, instrument dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha minimal 0,6. Pada uji realibilitas ini dimana didapatkan hasil seluruh 9 pertanyaan dinyatakan reliabel dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,622.

Lampiran 7. Contoh Lembar Informed Consent yang Sudah ditandatangani Responden

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa D3 Farmasi Politeknik Keshatian Tanjungkarang yang bernama Lia Maulani dengan judul "**GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANALGESIK PADA SWAMEDIKASI NYERI DI MASYARAKAT DESA SIRNA GALIH KECAMATAN ULUBELU KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025**" Saya memahami dan mengerti bahwa penelitian ini tidak berdampak buruk terhadap saya, maka dari itu saya bersedia menjadi responden peneliti.

Lampung, Januari 2025

<p>Peneliti</p>  <p>(Lia Maulani)</p>	<p>Responden</p> 
---	--

Lampiran 8. Contoh Kuesioner yang Sudah diisi Responden

Nama : [REDACTED]
 Domisili : [REDACTED]
 Jenis kelamin : Perempuan Laki-laki
 Usia : 17-25 th 26-45 th 46-65 th >65 th
 Pekerjaan : Bekerja Tidak bekerja

Alasan melakukan swamedikasi

1. Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri?
 - a. Kurang puas terhadap pelayanan kesehatan
 - b. Buaya lebih murah
 - Praktis dalam segi waktu
 - d. Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan
 - e. Alasan lainnya, sebutkan...

Nama dagang, penggolongan, dan kandungan zat aktif

2. Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri?
 - Novasten (asam mefenamat) **Ameftan**
 - b. Novalgin (metamizole)
 - c. Aspilets (asam acetilsalisilat)
 - d. Panadol (paracetamol)
 - e. Proris (ibuprofen)
 - f. Lainnya, sebutkan...

Kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat

3. Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari?
 - a. 1 x sehari
 - 2 x sehari
 - c. 3 x sehari
 - d. 4 x sehari
 - e. Lainnya, sebutkan...
4. Kapan anda meminum obat tersebut?
 - a. Sebelum makan
 - Sesudah makan
 - c. Lainnya, sebutkan...

5. Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan?
 - a. Menggandakan dosis di siang hari
 - b. Melewatkan dosis yang terlewati
 - c. Lainnya, sebutkan...
6. Apakah anda rutin mengonsumsi obat tersebut?
 - a. Rutin
 - b. Jika nyeri saja
 - c. Lainnya, sebutkan...

Tempat mendapatkan obat

7. Di mana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri?
 - a. Toko obat
 - b. Warung
 - c. Apotek
 - d. Tempat lainnya, sebutkan...

Sumber informasi untuk mendapatkan obat

8. Di mana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri?
 - a. Tenaga Kesehatan
 - b. Media cetak (brosur, leaflet, poster)
 - c. Media elektronik (tv, radio, internet)
 - d. Lainnya, sebutkan...

Tidak lanjut suatu tindakan yang dilakukan responden

9. Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri?
 - a. Ke puskesmas
 - b. Ke klinik
 - c. Ke rumah sakit
 - d. Lainnya, sebutkan. *Beda*

Lampiran 9. Dokumentasi Pengambilan Data





Lampiran 10. Lembar Hasil Pengumpulan Data Penelitian

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
1	Ny. SAT	Perempuan	21th	Bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
2	Ny. R	Perempuan	47th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paratusin	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Mengkonsumsi obat herbal
3	tn. AS	Laki-laki	43th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Bodrex	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
4	Ny. S	Perempuan	52th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Kerabat	Ke klinik

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
								yang terlewat							
5	Ny. SO	Perempuan	24th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
6	Ny. K	Perempuan	52th	Bekerja	Biaya lebih murah	Mirasic	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke klinik
7	Ny. CT	Perempuan	29th	Bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke klinik
8	Tn. RSP	Laki-laki	24th	Bekerja	Biaya lebih murah	Anastan	3xsehari	Sesudah makan	Menggantikan dosis di siang hari	Rutin	Keras	Asam mefenamat	Toko obat	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melukukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
9	Ny. N	Perempuan	40th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke klinik
10	Ny. N	Perempuan	42th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Oskadon Sp	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Ibuprofen	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Kerokan
11	Ny. Y	Perempuan	40th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Panadol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
12	Ny. S	Perempuan	34th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke	Mirasic	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media cetak (brosur,	Ke klinik

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobat an sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminu m obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminu m obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminu m obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin memin num obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandung an zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					pelayanan kesehatan				yang terlewat					leaflet, poster)	
13	Ny. S	Perempuan	26th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Paracetamol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media cetak (brosur, leaflet, poster)	Ke klinik
14	Ny. IM	Perempuan	29th	Tidak bekerja	Praktis dalam segi waktu	Paracetamol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke bidan
15	Tn. P	Laki-laki	43th	Bekerja	Dirasa penyakit ringan	Ponstan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melukukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
16	Tn. H	Laki-laki	21th	Bekerja	Praktis dalam segi waktu	Panadol	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
17	Tn. SAK	Laki-laki	21th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
18	Ny. K	Perempuan	36th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Sumagesic	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke klinik
19	Tn. S	Laki-laki	42th	Bekerja	Biaya lebih murah	Mirasic	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke klinik
20	Ny. K	Perempuan	61th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Paracetamol	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobat an sendiri? (P1)	Obat apa yang digunaka n ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminu m obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminu m obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminu m obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin memin num obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandung an zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					n kesehatan										
21	Ny. TM	Perempuan	31th	Bekerja	Praktis dalam segi waktu	Asam mefenamat	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan
22	Ny. RA	Perempuan	20th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	3xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
23	Tn. A	Laki-laki	21th	Bekerja	Biaya lebih murah	Ponstan	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
24	Ny. N	Perempuan	54th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobat an sendiri? (P1)	Obat apa yang digunaka n ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminu m obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminu m obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminu m obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin memin num obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandung an zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
25	Tn. H	Laki-laki	42th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	1xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Kerabat	Ke klinik
26	Tn. I	Laki-laki	39th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Kerabat	Ke klinik
27	Ny. AL	Perempuan	26th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	3xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
28	Tn. DP	Laki-laki	20th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Menggan ti jam minum	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
29	Ny. I	Perempuan	28th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke rumah sakit

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
30	Ny. C	Perempuan	27th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Sumages ic	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Rutin	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
31	Ny. EK	Perempuan	40th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Sumages ic	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
32	Tn. S	Laki-laki	41th	Bekerja	Biaya lebih murah	Tifestan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
33	Ny. YD	Perempuan	19th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	1xsehari	Sebelum tidur	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
34	Ny. S	Perempuan	55th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Paramex	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Tenaga kesehatan	Ke klinik

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melukukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					n kesehatan										
35	Ny. SM	Perempuan	38th	Tidak bekerja	Praktis dalam segi waktu	Ibuprofen	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Ibuprofen	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan
36	Tn. N	Laki-laki	65th	Bekerja	Praktis dalam segi waktu	Ibuprofen	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Ibuprofen	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
37	Tn.E A	Laki-laki	21th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex extra	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Ibuprofen	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke rumah sakit
38	Tn.D	Laki-laki	24th	Bekerja	Biaya lebih murah	Asam mefenamat	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Toko obat	Tenaga kesehatan	Mengkonsumsi obat merk lain

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
39	Tn.Y AP	Laki-laki	24th	Bekerja	Kurang puas terhadap pelayanan kesehatan	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
40	Tn.D	Laki-laki	55th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Media elektronik (tv, radio, internet)	Kerokan
41	Ny.S	Perempuan	46th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
42	Tn.A	Laki-laki	54th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Anastan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
43	Tn.S	Laki-laki	41th	Bekerja	Biaya lebih murah	Sumagesic	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
44	Ny.U	Perempuan	40th	Bekerja	Biaya lebih murah	Sumagesic	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke klinik
45	Tn.K	Laki-laki	56th	Bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke klinik
46	Tn. JM	Laki-laki	48th	Bekerja	Praktis dalam segi waktu	Anastan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobat an sendiri? (P1)	Obat apa yang digunaka n ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminu m obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminu m obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminu m obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin memin num obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandung an zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
47	Tn. MJ	Laki-laki	34th	Bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex	1xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Mengkonsumsi obat merk lain
48	Tn. KB	Laki-laki	26th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
49	Ny. RS	Perempuan	26th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Tifestan	2xsehari	Sebelum makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan
50	Ny. HK	Perempuan	64th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan	Paracetamol	1xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke rumah sakit

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobat an sendiri? (P1)	Obat apa yang digunaka n ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminu m obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminu m obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminu m obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin memin num obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandung an zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
51	Ny. K	Perempuan	45th	Bekerja	Praktis dalam segi waktu	Ponstan	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
52	Ny. RA	Perempuan	22th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan	Opistan	3xsehari	Sesudah makan	Menggan dakan dosis di siang hari	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
53	Ny. N	Perempuan	29th	Tidak bekerja	Kurang puas terhadap pelayanan kesehatan	Ponstan	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Warung	Kerabat	Ke puskesmas
54	Tn. AA	Laki-laki	26th	Bekerja	Jarak yang jauh ke fasilitas	Bodrex	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Ke puskesmas

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
55	Ny. SK	Perempuan	52th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Dexamet hasone	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Dexamet hasone	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
56	Tn. AG	Laki-laki	25th	Bekerja	Kurang puas terhadap pelayanan kesehatan	Paracetamol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
57	Ny. I	Perempuan	32th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
58	Tn. HS	Laki-laki	25th	Bekerja	Jarak yang jauh ke	Mixagrip	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis	Rutin	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik	Ke klinik

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					pelayanan kesehatan				yang terlewat					(tv, radio, internet)	
59	Ny. A	Laki-laki	64th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Mixagrip	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Mengkonsumsi obat herbal
60	Ny. H	Perempuan	54th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Asam mefenamat	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Resep lama	Ke klinik
61	Ny. H	Perempuan	60th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Oskadon	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
62	Tn. S	Laki-laki	65th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Oskadon	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
63	Ny. S	Perempuan	29th	Tidak bekerja	Praktis dalam segi waktu	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Kerokan
64	Tn. S	Laki-laki	34th	Bekerja	Praktis dalam segi waktu	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Kerokan
65	Ny. Y	Perempuan	26th	Bekerja	Jarak yang jauh ke	Mixagrip	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					pelayanan kesehatan				yang terlewat						
66	Ny. SK	Perempuan	22th	Tidak bekerja	Praktis dalam segi waktu	Paramex	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Media cetak (brosur, leaflet, poster)	Ke bidan
67	Tn. S	Laki-laki	27th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Mixagrip	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan
68	Ny. S	Perempuan	39th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Ultraflu	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Kerokan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
69	Ny. IS	Perempuan	35th	Tidak bekerja	Praktis dalam segi waktu	Bodrex migra	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Kerokan
70	Tn. KS	Laki-laki	19th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paratusin	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Apotek	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
71	Tn. MR	Laki-laki	40th	Bekerja	Biaya lebih murah	Paratusin	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan
72	Ny. EA	Perempuan	25th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Mixagrip	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Mengkonsumsi obat herbal

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
73	Tn. I	Laki-laki	30th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Ponstan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Asam mefenamat	Apotek	Tenaga kesehatan	Mengkonsumsi obat merk lain
74	Ny. DW	Perempuan	39th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Paramex	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Kerabat	Mengkonsumsi obat merk lain
75	Tn. A	Laki-laki	30th	Bekerja	Kurang puas terhadap pelayanan	Paracetamol	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke puskesmas

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
76	Ny. SZ	Perempuan	31th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Toko obat	Tenaga kesehatan	Ke bidan
77	Tn. S	Laki-laki	62th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Bodrex extra	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Ibuprofen	Warung	Penjaga warung	Ke klinik
78	Ny. T	Perempuan	58th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Ultraflu	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Kerokan
79	Tn. S	Laki-laki	64th	Bekerja	Merasa cocok	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media cetak (brosur,	Mengkonsumsi obat merk lain

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif (P7)	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P8)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P9)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P10)
					dengan obat				yang terlewat					lesflet, internet)	
80	Tn. E	Laki-laki	42th	Bekerja	Biaya lebih murah	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
81	Ny. M	Perempuan	43th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Dexamet hasone	3xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Keras	Dexamet hasone	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan
82	Ny. N	Perempuan	38th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Ultraflu	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
83	Ny. SW	Perempuan	27th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paracetamol	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
									yang terlewat						
84	Tn. E	Laki-laki	35th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Mixagrip	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
85	Tn. S	Laki-laki	45th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Mengkonsumsi obat herbal
86	Ny. D	Perempuan	39th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Mengkonsumsi obat herbal

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					kesehatan										
87	Ny. S	Perempuan	50th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Paramex	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Kerabat	Ke bidan
88	Tn. E	Laki-laki	63th	Bekerja	Biaya lebih murah	Oskadon	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Ke bidan
89	Tn. T	Laki-laki	31th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Bodrex extra	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Ibuprofen	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
90	Ny. Y	Perempuan	62th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex migra	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol,	Warung	Kerabat	Ke bidan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakukan pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengalami nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darimana anda membeli obat untuk pengobatan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
									yang terlewat			Propyphenazine			
91	Ny. R	Perempuan	32th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Mengkonsumsi obat merk lain
92	Ny. N	Perempuan	57th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Ke bidan
93	Ny. R	Perempuan	51th	Tidak bekerja	Praktis dalam segi waktu	Bodrex	2xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
94	Tn. P	Laki-laki	44th	Bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex	1xsehari	Sesudah makan	Melewatan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke rumah sakit

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobatan sendiri? (P1)	Obat apa yang digunakan ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandungan zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
95	Ny. S	Perempuan	55th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Bodrex migra	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke bidan
96	Ny. T	Perempuan	65th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Paramex	3xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik
97	Ny. WN	Perempuan	33th	Tidak bekerja	Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	Paratusin	3xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Apotek	Tenaga kesehatan	Ke puskesmas
98	Tn. A	Laki-laki	41th	Bekerja	Jarak yang jauh ke	Mixagrip	1xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol	Warung	Media elektronik	Ke klinik

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Apa alasan anda melakuk an pengobat an sendiri? (P1)	Obat apa yang digunaka n ketika mengala mi nyeri? (P2)	Berapa kali anda meminu m obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminu m obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminu m obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin memin num obat tersebut ? (P6)	Golongan obat	Kandung an zat aktif	Darima na anda membe li obat untuk pengob atan nyeri? (P7)	Darimana anda mendapatkan informasi terkait obat untuk mengatasi nyeri? (P8)	Apa tindakan selanjutnya yang anda lakukan jika nyeri masih berlanjut setelah melakukan pengobatan sendiri? (P9)
					pelayana n kesehatan				yang terlewat					(tv, radio, internet)	
99	Ny. M	Perempuan	62th	Tidak bekerja	Biaya lebih murah	Panadol	2xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas	Paracetamol	Warung	Kerabat	Ke bidan
100	Tn. EP	Laki-laki	46th	Bekerja	Jarak yang jauh ke pelayana n kesehatan	Paramex	1xsehari	Sesudah makan	Melewati kan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Bebas terbatas	Paracetamol, Propyphenazone	Warung	Media elektronik (tv, radio, internet)	Ke klinik

Lampiran 11. Tingkat Kesesuaian antara Minum Obat Responden dengan Aturan Pakai pada Kemasan Obat

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
1	Ny. SAT	Perempuan	21th	Bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
2	Ny. R	Perempuan	47th	Bekerja	Paratusin	3 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
3	tn. AS	Laki-laki	43th	Bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
4	Ny. S	Perempuan	52th	Tidak bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
5	Ny. SO	Perempuan	24th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
6	Ny. K	Perempuan	52th	Bekerja	Mirasic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
7	Ny. CT	Perempuan	29th	Bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
8	Tn. RSP	Laki-laki	24th	Bekerja	Anastan	3 x sehari 1 kaplet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Menggandakan dosis di siang hari	Rutin	Cukup sesuai
9	Ny. N	Perempuan	40th	Tidak bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
10	Ny. N	Perempuan	42th	Tidak bekerja	Oskadon Sp	3-4 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
11	Ny. Y	Perempuan	40th	Tidak bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
12	Ny. S	Perempuan	34th	Tidak bekerja	Mirasic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
13	Ny. S	Perempuan	26th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
14	Ny. IM	Perempuan	29th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
15	Tn. P	Laki-laki	43th	Bekerja	Ponstan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
16	Tn. H	Laki-laki	21th	Bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
17	Tn. SAK	Laki-laki	21th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
18	Ny. K	Perempuan	36th	Tidak bekerja	Sumagesic	3-4 x sehari 1 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
19	Tn. S	Laki-laki	42th	Bekerja	Mirasic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
20	Ny. K	Perempuan	61th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
						atau sesudah makan					
21	Ny. TM	Perempuan	31th	Bekerja	Asam mefenamat	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
22	Ny. RA	Perempuan	20th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
23	Tn. A	Laki-laki	21th	Bekerja	Ponstan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
24	Ny. N	Perempuan	54th	Tidak bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
25	Tn. H	Laki-laki	42th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
26	Tn. I	Laki-laki	39th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
27	Ny. AL	Perempuan	26th	Tidak bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
28	Tn. DP	Laki-laki	20th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Mengganti jam minum	Jika nyeri saja	Sesuai
29	Ny. I	Perempuan	28th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
30	Ny. C	Perempuan	27th	Tidak bekerja	Sumagesic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Rutin	Sesuai
31	Ny. EK	Perempuan	40th	Tidak bekerja	Sumagesic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
32	Tn. S	Laki-laki	41th	Bekerja	Tifestan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
33	Ny. YD	Perempuan	19th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum	1xsehari	Sebelum tidur	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
						atau sesudah makan					
34	Ny. S	Perempuan	55th	Tidak bekerja	Paramex	2-3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
35	Ny. SM	Perempuan	38th	Tidak bekerja	Ibuprofen	3-4 x sehari 1 tablet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
36	Tn. N	Laki-laki	65th	Bekerja	Ibuprofen	3-4 x sehari 1 tablet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
37	Tn.EA	Laki-laki	21th	Tidak bekerja	Bodrex extra	3-4 x sehari 1-2 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
38	Tn.D	Laki-laki	24th	Bekerja	Asam mefenamat	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
39	Tn.YAP	Laki-laki	24th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
40	Tn.D	Laki-laki	55th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
41	Ny.S	Perempuan	46th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
42	Tn.A	Laki-laki	54th	Bekerja	Anastan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
43	Tn.S	Laki-laki	41th	Bekerja	Sumagesic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
44	Ny.U	Perempuan	40th	Bekerja	Sumagesic	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
45	Tn.K	Laki-laki	56th	Bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
46	Tn. JM	Laki-laki	48th	Bekerja	Anastan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
47	Tn. MJ	Laki-laki	34th	Bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
48	Tn. KB	Laki-laki	26th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
49	Ny. RS	Perempuan	26th	Tidak bekerja	Tifestan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sebelum makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
50	Ny. HK	Perempuan	64th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
51	Ny. K	Perempuan	45th	Bekerja	Ponstan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
52	Ny. RA	Perempuan	22th	Tidak bekerja	Opistan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Menggandakan dosis di siang hari	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
53	Ny. N	Perempuan	29th	Tidak bekerja	Ponstan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
54	Tn. AA	Laki-laki	26th	Bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
55	Ny. SK	Perempuan	52th	Tidak bekerja	Dexamethasone	0,5-10 mg per hari	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
56	Tn. AG	Laki-laki	25th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
57	Ny. I	Perempuan	32th	Tidak bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
58	Tn. HS	Laki-laki	25th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Rutin	Cukup sesuai
59	Ny. A	Laki-laki	64th	Tidak bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
60	Ny. H	Perempuan	54th	Tidak bekerja	Asam mefenamat	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
61	Ny. H	Perempuan	60th	Tidak bekerja	Oskadon	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
62	Tn. S	Laki-laki	65th	Bekerja	Oskadon	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
63	Ny. S	Perempuan	29th	Tidak bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
64	Tn. S	Laki-laki	34th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
65	Ny. Y	Perempuan	26th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
66	Ny. SK	Perempuan	22th	Tidak bekerja	Paramex	2-3 x sehari 1 tablet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
67	Tn. S	Laki-laki	27th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
68	Ny. S	Perempuan	39th	Tidak bekerja	Ultraflu	3-4 x sehari 1-2 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
69	Ny. IS	Perempuan	35th	Tidak bekerja	Bodrex migra	3 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
70	Tn. KS	Laki-laki	19th	Bekerja	Paratusin	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
71	Tn. MR	Laki-laki	40th	Bekerja	Paratusin	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
72	Ny. EA	Perempuan	25th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
73	Tn. I	Laki-laki	30th	Bekerja	Ponstan	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
74	Ny. DW	Perempuan	39th	Tidak bekerja	Paramex	2-3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
75	Tn. A	Laki- laki	30th	Bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
76	Ny. SZ	Perempuan	31th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
77	Tn. S	Laki-laki	62th	Bekerja	Bodrex extra	3-4 x sehari 1-2 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
78	Ny. T	Perempuan	58th	Tidak bekerja	Ultraflu	3-4 x sehari 1-2 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
79	Tn. S	Laki-laki	64th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
80	Tn. E	Laki-laki	42th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
81	Ny. M	Perempuan	43th	Tidak bekerja	Dexamethasone	0,5-10 mg per hari	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
82	Ny. N	Perempuan	38th	Tidak bekerja	Ultraflu	3-4 x sehari 1-2 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
83	Ny. SW	Perempuan	27th	Tidak bekerja	Paracetamol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
84	Tn. E	Laki-laki	35th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
85	Tn. S	Laki-laki	45th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkhan dosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
86	Ny. D	Perempuan	39th	Tidak bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
87	Ny. S	Perempuan	50th	Tidak bekerja	Paramex	2-3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
88	Tn. E	Laki-laki	63th	Bekerja	Oskadon	3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
89	Tn. T	Laki-laki	31th	Bekerja	Bodrex extra	3-4 x sehari 1-2 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
90	Ny. Y	Perempuan	62th	Tidak bekerja	Bodrex migra	3 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
91	Ny. R	Perempuan	32th	Tidak bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
92	Ny. N	Perempuan	57th	Tidak bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
93	Ny. R	Perempuan	51th	Tidak bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Nama obat analgesik (P2)	Aturan pakai obat pada kemasan	Berapa kali anda meminum obat tersebut dalam sehari? (P3)	Kapan anda meminum obat tersebut? (P4)	Jika anda lupa meminum obat di pagi hari, apa yang anda lakukan? (P5)	Apakah anda rutin meminum obat tersebut? (P6)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat
94	Tn. P	Laki-laki	44th	Bekerja	Bodrex	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
95	Ny. S	Perempuan	55th	Tidak bekerja	Bodrex migra	3 x sehari 1 kaplet sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
96	Ny. T	Perempuan	65th	Tidak bekerja	Paramex	2-3 x sehari 1 tablet sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
97	Ny. WN	Perempuan	33th	Tidak bekerja	Paratusin	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	3xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sangat sesuai
98	Tn. A	Laki-laki	41th	Bekerja	Mixagrip	3-4 x sehari 1 kaplet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
99	Ny. M	Perempuan	62th	Tidak bekerja	Panadol	3-4 x sehari 1-2 kaplet sebelum atau sesudah makan	2xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai
100	Tn. EP	Laki-laki	46th	Bekerja	Paramex	2-3 x sehari 1 tablet sesudah makan	1xsehari	Sesudah makan	Melewatkandosis yang terlewat	Jika nyeri saja	Sesuai

Keterangan: tanda kuning artinya tidak sesuai dengan aturan pakai obat pada kemasan

Lampiran 12. Lembar Pengolahan Data Penelitian

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaaan	Alasan melakukan swamedikasi (P1)	Nama dagang obat (P2)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat					Golongan obat (P2)	Kandungan zat aktif (P2)	Tempat mendapatkan obat (P7)	Sumber informasi untuk mendapatkan obat (P8)	Tindak lanjut yang dilakukan responden (P9)	
							P3	P4	P5	P6	TOTAL						
1	Ny. SAT	1	1	1	2	4	3	2	2	2	5	1	4		1	3	2
2	Ny. R	1	3	1	2	6	2	2	2	2	4	2	4		3	1	5
3	Tn. AS	2	2	1	4	7	1	2	2	2	4	1	4		2	3	4
4	Ny. S	1	3	2	2	4	2	2	2	2	4	1	4		1	4	2
5	Ny. SO	1	1	1	2	9	2	2	2	2	4	1	4		1	3	2
6	Ny. K	1	3	1	2	8	3	2	2	2	5	1	4		1	1	2
7	Ny. CT	1	2	1	2	4	3	2	2	2	5	1	4		1	1	2
8	Tn. RSP	2	1	1	2	10	3	2	1	1	3	3	1		1	3	4
9	Ny. N	1	2	2	2	4	2	2	2	2	4	1	4		1	1	2
10	Ny. N	1	2	2	4	22	2	2	2	2	4	2	4	5	2	3	6
11	Ny. Y	1	2	2	4	4	3	2	2	2	5	1	4		1	3	2
12	Ny. S	1	2	2	4	8	3	2	2	2	5	1	4		1	2	2
13	Ny. S	1	2	2	4	9	3	2	2	2	5	1	4		1	2	2
14	Ny. IM	1	2	2	3	9	3	2	2	2	4	1	4		1	1	4
15	Tn. P	2	2	1	5	12	1	2	2	2	4	3	1		1	1	4
16	Tn. H	2	1	1	3	4	1	2	2	2	4	1	4	3	1	1	1

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Alasan melakukan swamedikasi (P1)	Nama dagang obat (P2)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat					Golongan obat (P2)	Kandungan zat aktif (P2)	Tempat mendapatkan obat (P7)	Sumber informasi untuk mendapatkan obat (P8)	Tindak lanjut yang dilakukan responden (P9)	
							P3	P4	P5	P6	TOTAL						
17	Tn. SAK	2	1	2	2	9	2	2	2	2	4	1	4		1	3	2
18	Ny. K	1	2	2	2	13	3	2	2	2	5	1	4		1	1	2
19	Tn. S	2	2	1	2	8	2	2	2	2	4	1	4		1	1	2
20	Ny. K	1	3	2	4	9	1	2	2	2	4	1	4		3	1	1
21	Ny. TM	1	2	1	3	14	2	2	2	2	4	3	1		3	1	4
22	Ny. RA	1	1	2	2	9	3	2	2	2	5	1	4		3	1	2
23	Tn. A	2	1	1	2	12	2	2	2	2	4	3	1		3	1	2
24	Ny. N	1	3	2	2	4	2	2	2	2	4	1	4		3	1	2
25	Tn. H	2	2	1	2	9	1	2	2	2	4	1	4		3	4	2
26	Tn. I	2	2	1	2	9	2	2	2	2	4	1	4		3	4	2
27	Ny. AL	1	2	2	2	4	3	2	2	2	5	1	4		3	1	2
28	Tn. DP	2	1	1	2	9	2	2	3	2	4	1	4		3	1	1
29	Ny. I	1	2	2	2	9	2	2	2	2	4	1	4		3	1	3
30	Ny. C	1	2	2	2	13	3	2	2	1	4	1	4		3	1	2
31	Ny. EK	1	2	2	2	13	3	2	2	2	5	1	4		3	1	2
32	Tn. S	2	2	1	2	15	2	2	2	2	4	3	1		3	1	2

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaaan	Alasan melakukan swamedikasi (P1)	Nama dagang obat (P2)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat					Golongan obat (P2)	Kandungan zat aktif (P2)	Tempat mendapatkan obat (P7)	Sumber informasi untuk mendapatkan obat (P8)	Tindak lanjut yang dilakukan responden (P9)	
							P3	P4	P5	P6	TOTAL						
33	Ny. YD	1	1	2	2	9	1	3	2	2	4	1	4		3	1	2
34	Ny. S	1	3	2	4	21	2	2	2	2	5	2	4	7	2	1	2
35	Ny. SM	1	2	2	3	17	3	2	2	2	5	3	5		3	1	4
36	Tn. N	2	3	1	3	17	3	2	2	2	4	3	5		3	1	2
37	Tn.EA	2	1	2	2	24	1	2	2	2	4	2	4	5	3	1	3
38	Tn.D	2	1	1	2	14	1	2	2	2	4	3	1		1	1	7
39	Tn.YA P	2	1	1	1	9	2	2	2	2	4	1	4		3	1	1
40	Tn.D	2	3	1	2	9	2	2	2	2	4	1	4		3	3	6
41	Ny.S	1	3	2	2	9	2	2	2	2	4	1	4		3	3	2
42	Tn.A	2	3	1	4	10	2	2	2	2	4	3	1		3	1	1
43	Tn.S	2	2	1	2	13	2	2	2	2	4	1	4		3	1	2
44	Ny.U	1	2	1	2	13	2	2	2	2	4	1	4		3	1	2
45	Tn.K	2	3	1	2	7	1	2	2	2	4	1	4		1	1	2
46	Tn. JM	2	3	1	3	10	2	2	2	2	4	3	1		3	1	4
47	Tn. MJ	2	2	1	2	7	1	2	2	2	4	1	4		2	3	7
48	Tn. KB	2	2	1	2	9	2	2	2	2	4	1	4		3	1	1
49	Ny. RS	1	2	2	2	15	2	1	2	2	4	3	1		3	1	4

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Alasan melakukan swamedikasi (P1)	Nama dagang obat (P2)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat					Golongan obat (P2)	Kandungan zat aktif (P2)	Tempat mendapatkan obat (P7)	Sumber informasi untuk mendapatkan obat (P8)	Tindak lanjut yang dilakukan responden (P9)	
							P3	P4	P5	P6	TOTAL						
50	Ny. HK	1	3	2	4	9	1	2	2	2	4	1	4		3	1	3
51	Ny. K	1	2	1	3	12	2	2	2	2	4	3	1		3	1	1
52	Ny. RA	1	1	2	4	18	3	2	1	2	5	3	1		3	1	1
53	Ny. N	1	2	2	1	12	2	2	2	2	4	3	1		2	4	1
54	Tn. AA	2	2	1	4	7	2	2	2	2	4	1	4		2	4	1
55	Ny. SK	1	3	2	2	19	3	2	2	2	5	3	6		3	1	1
56	Tn. AG	2	1	1	1	9	3	2	2	2	5	1	4		3	1	1
57	Ny. I	1	2	2	2	7	1	2	2	2	4	1	4		2	3	2
58	Tn. HS	2	1	1	4	20	2	2	2	1	3	2	4		2	3	2
59	Ny. A	1	3	2	4	20	2	2	2	2	4	2	4		2	3	5
60	Ny. H	1	3	2	2	14	3	2	2	2	5	3	1		3	5	2
61	Ny. H	1	3	2	4	11	1	2	2	2	4	1	4		2	3	4
62	Tn. S	2	3	1	4	11	1	2	2	2	4	1	4		2	3	4
63	Ny. S	1	2	2	3	20	1	2	2	2	4	2	4		2	4	6
64	Tn. S	2	2	1	3	20	1	2	2	2	4	2	4		2	4	6
65	Ny. Y	1	2	1	4	20	2	2	2	2	4	2	4		2	4	4

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaaan	Alasan melakukan swamedikasi (P1)	Nama dagang obat (P2)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat					Golongan obat (P2)	Kandungan zat aktif (P2)	Tempat mendapatkan obat (P7)	Sumber informasi untuk mendapatkan obat (P8)	Tindak lanjut yang dilakukan responden (P9)	
							P3	P4	P5	P6	TOTAL						
66	Ny. SK	1	1	2	3	21	3	2	2	2	5	2	4	7	2	2	4
67	Tn. S	2	2	1	4	20	3	2	2	2	5	2	4		3	1	4
68	Ny. S	1	2	2	4	16	2	2	2	2	4	2	4		2	3	6
69	Ny. IS	1	2	2	3	23	1	2	2	2	4	2	4	7	2	3	6
70	Tn. KS	2	1	1	2	6	3	2	2	2	5	2	4		3	3	2
71	Tn. MR	2	2	1	2	6	2	2	2	2	4	2	4		3	1	4
72	Ny. EA	1	1	1	4	20	2	2	2	2	4	2	4		2	4	5
73	Tn. I	2	2	1	4	12	2	2	2	2	4	3	1		3	1	7
74	Ny. DW	1	2	2	4	21	1	2	2	2	4	2	4	7	2	4	7
75	Tn. A	2	2	1	1	9	3	2	2	2	4	1	4		1	3	1
76	Ny. SZ	1	2	2	2	9	2	2	2	2	4	1	4		1	1	4
77	Tn. S	2	3	1	4	24	2	2	2	2	4	2	4	5	2	6	2
78	Ny. T	1	3	2	2	16	1	2	2	2	4	2	4		2	3	6
79	Tn. S	2	3	1	6	20	1	2	2	2	4	2	4		2	2	7
80	Tn. E	2	2	1	2	20	1	2	2	2	4	2	4		2	3	4
81	Ny. M	1	2	2	2	19	3	2	2	2	5	3	6		3	1	4
82	Ny. N	1	2	2	4	16	2	2	2	2	4	2	4		2	3	4

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Alasan melakukan swamedikasi (P1)	Nama dagang obat (P2)	Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat					Golongan obat (P2)	Kandungan zat aktif (P2)	Tempat mendapatkan obat (P7)	Sumber informasi untuk mendapatkan obat (P8)	Tindak lanjut yang dilakukan responden (P9)	
							P3	P4	P5	P6	TOTAL						
83	Ny. SW	1	2	2	2	9	1	2	2	2	4	1	4		3	1	4
84	Tn. E	2	2	1	4	20	2	2	2	2	4	2	4		2	3	4
85	Tn. S	2	2	1	4	20	1	2	2	2	4	2	4		2	3	5
86	Ny. D	1	2	2	4	20	1	2	2	2	4	2	4		2	3	5
87	Ny. S	1	3	2	2	21	1	2	2	2	4	2	4	7	2	4	4
88	Tn. E	2	3	1	2	11	1	2	2	2	4	1	4		2	4	4
89	Tn. T	2	2	1	4	24	2	2	2	2	4	2	4	5	2	3	4
90	Ny. Y	1	3	2	2	23	1	2	2	2	4	2	4	7	2	4	4
91	Ny. R	1	2	2	2	20	1	2	2	2	4	2	4		2	4	7
92	Ny. N	1	3	2	2	20	1	2	2	2	4	2	4		2	4	4
93	Ny. R	1	3	2	3	7	2	2	2	2	4	1	4		2	3	4
94	Tn. P	2	2	1	2	7	1	2	2	2	4	1	4		2	3	3
95	Ny. S	1	3	2	2	23	2	2	2	2	4	2	4	7	2	3	4
96	Ny. T	1	3	2	4	21	3	2	2	2	5	2	4	7	2	3	2
97	Ny. WN	1	2	2	4	6	3	2	2	2	5	2	4		3	1	1
98	Tn. A	2	2	1	4	20	1	2	2	2	4	2	4		2	3	2
99	Ny. M	1	3	2	2	4	2	2	2	2	4	1	4		2	4	4
100	Tn. EP	2	3	1	4	21	1	2	2	2	4	2	4	7	2	3	2

Keterangan:	Nama dagang obat:
Jenis kelamin:	
1 = Perempuan	1 = Novastan
2 = Laki-laki	2 = Nofalgin
Usia:	
1 = Remaja 17-25 th	3 = Aspilets
2 = Dewasa 26-45 th	4 = Panadol
3 = Lansia 46-65 th	5 = Proris
Pekerjaan:	
1 = Bekerja	6 = Paratusin
2 = Tidak bekerja	7 = Bodrex
Alasan melakukan swamedikasi:	
1 = Kurang puas terhadap pelayanan kesehatan	8 = Mirasic
2 = Biaya lebih murah	9 = Paracetamol
3 = Praktis dalam segi waktu	10 = Anastan
4 = Jarak yang jauh ke pelayanan kesehatan	11 = Oskadon
5 = Dirasa penyakit ringan	12 = Ponstan
6 = Merasa cocok dengan obat	13 = Sumagesic
	14 = Asam mefenamat
	15 = Tifestan
	16 = Ultraflu
	17 = Ibuprofen
	18 = Opistan
	19 = Dexamethasone
	20 = Mixagrip
	21 = Paramex
	22 = Oskadon Sp
	23 = Bodrex migra

24 = Bodrex extra

3 = Cukup sesuai (skor 2)

Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat (P3):

1 = 1 x sehari

4 = Sesuai (skor 3)

2 = 2 x sehari

5 = Sangat sesuai (skor 4)

3 = 3 x sehari

Golongan obat:

Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat (P4):

1 = Sebelum makan

1 = Bebas

2 = Sesudah makan

2 = Bebas terbatas

3 = Sebelum tidur

3 = Keras

Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat (P5):

1 = Menggandakan dosis di siang hari

1 = Asam mefenamat

2 = Melewatkhan dosis yang terlewat

2 = Antalgin

3 = Mengganti jam minum

3 = Asam asetil salisilat

Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat (P6):

1 = Rutin

4 = Paracetamol

2 = Jika nyeri saja

5 = Ibuprofen

Tingkat kesesuaian minum obat dengan aturan pakai pada kemasan obat (Total):

1 = Sangat tidak sesuai (skor 0)

6 = Dexamethasone

2 = Tidak sesuai (skor 1)

7 = Propyphenazone

Tempat mendapatkan obat:

1 = Toko obat

2 = Warung

3 = Apotek

Sumber informasi untuk mendapatkan obat:

1 = Tenaga kesehatan

2 = Media cetak (brosur, *leaflet*, poster)

- 3 = Media elektronik (tv, radio,
internet)
- 4 = Kerabat
- 5 = Resep lama
- 6 = Penjaga warung
- Tindak lanjut suatu tindakan yang
dilakukan responden:**
- 1 = Ke puskesmas
- 2 = Ke klinik
- 3 = Ke rumah sakit
- 4 = Ke bidan
- 5 = Mengkonsumsi obat herbal
- 6 = Kerokan
- 7 = Mengkonsumsi obat merk lain

Lampiran 13. Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR (I)

NAMA MAHASISWA : Lia Maulani

NIM : 2248401056

DOSEN PEMBIMBING : Makhdalena, S. Farm., M. Farm., Apt

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	3 / 2022 Jan	Pengajuan judul penelitian	Revisi judul penelitian	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	6 / 2022 Jan	- Pengajuan judul penelitian - Bimbingan BAB 1 - 3	- Acc judul penelitian - Pengarahan penulisan - Penulisan judul dan BAB 1-3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	10 / 2022 Feb	- Bimbingan BAB 1 - 5	- Revisi Penulisan setiap fundum - Perbaikan isar kelakuan - Revisi BAB 2 - Revisi tujuan - Revisi Definisi Operasional (DOI) - Revisi Rancangan penelitian - Revisi prosedur penelitian - Buat daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
4.	11 / 2020 fth	Bimbingan BAB 1-3	<ul style="list-style-type: none"> - Revise penulisan - membuat informed consent - membuat bantuan pemeriksaan - membuat kalimat pengantar - membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran, dan daftar gambar. - Review kerangka teori dan kerangka konsep - menambahkan tabel isi - alert - menambahkan teori untuk bagian no. 9 - Memperbaiki halaman pengumpulan dan pengolahan data - Gunakan rumus menjadikan rumus standar 	✓	✓
5.	14 / 2020 fth	Bimbingan BAB 1-3	Acc BAB 1 - 3 <ul style="list-style-type: none"> - Revise penulisan 	✓	✓

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
6.	19 / 2023 Feb	- Bimbingan BAB 1 - 3	Ara BAB 1 - 3 - Perbaikan penulisan	/	OB
7.	21 / 2023 Feb	- Bimbingan Penulisan	Perbaikan kerangka teori (rapikan tulisan)	/	OB
8.	21 / 2023 Feb	- Konsultasi kec. turuanan BAB 1 - 3	Ara BAB 1 - 3	/	OB
9.	27 / 2023 Feb	Bimbingan BAB 1 - 3	- Revisi BAB 1 - 3 - Revisi Kuesioner, temperatur, judul - Revisi penulisan - Revisi judul " Gambaran Penggunaan Obat Analgesik Pada Swameditikasi Nyeri di Maternity Unit Senna Gantik Kas. Wabeta Kas. Tenggarong Tahun 2021" - Revisi kata pembantu	/	OB

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
			<p>tambahan dots pembelahan 2 dan dalam pengujian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisi tujuan Standa: judul - Revise ruang lingkup temuan "Masalah Dera Sirna Galih" - Kriteria dapat diperoleh dengan mudah - Tambah faktor pada tabel DNA - Huruf I & S pada t - Revise sub-komik F tambahan "Analgesik / Antiflammatory" - Revise Klasifikasi "Steroid & nonsteroid" - Revise fragmen kerangka teori 2 konsep (sejalan dengan tujuan) - BAB III : Penanganan Penelitian > buat <p>2 paragraf</p>		

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
10.	28 / feb 2022	Bimbingan Keseluruhan BAB 1 - 3	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan kriteria ekskuluri - Perbaikan kalimat di bagian teknik sampling - - Revise kata pengantar - perbaiki kalimat agar spok - font 10, spasi 1 (tabloid) - Kembangkan Kuesioner 	✓	✓
11.	21 / Mar 2022	Bimbingan Keseluruhan BAB 1 - 3	<ul style="list-style-type: none"> - Font 10, spasi 1 (tabloid) - Kembangkan Kuesioner - revisi tabloid 	✓	✓
12.	25 / Mar 2022	Bimbingan Penulisan	Acc BAB 1, BAB 2, BAB 3 - Revise penulisan	✓	✓
13.	26 / Mar 2022	Bimbingan Penulisan	Acc BAB 1, 2, 3	✓	✓

NO	TANGGAL	MASALAH	KEGIATAN	PARAF	
			PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
IV.	23 / 2021 Apr	Bimbingan BAB 4 dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi hasil penelitian awal - Pengembangan skripsi - Revisi teks hasil penelitian untuk menjawab tujuan 4 - Melakukan diskusi, persetujuan, dan tindak pengembangan - Revisi penulisan - Masukkannya surat izin penulisan di lampiran - Masukkan lama dokumentasi pengembangan dulu - Revisi pembelaan 	✓	✓
V	26 / 2021 Mei	Bimbingan ketemu wihon LTA	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi penulisan - tambahkan contoh lembar informed consent dan kuesioner yang sudah dilakukan responden - Penulisan res. ket. 	✓	✓

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
16.	27 / 2023 Mei	Bimbingan penulisan Spasi dan font	Acc Seminar hari	✓	A.

LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA : Lia Maulani

NIM : 2248401056

DOSEN PEMBIMBING 2 : Apt. Ageng Hassah Fauziyah, S. Farm., M. Farm

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
1.	28 / 2022 Feb	Pengumpulan draft BAB 1 - 3	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi penulisan Seuaai Panduan - Rapikan tabel 00 - Ace dengan selekit perbaikan 	GJ	A.
2.	25 / 2022 Mar	Pengumpulan revisi BAB 1 - 3	<ul style="list-style-type: none"> - Ace BAB 1 - 3 	GJ	A.
3.	23 / 2022 Mei	Pengumpulan hasil penelitian Pengumpulan BAB 4 dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi penulisan Seuaai Panduan - Font tabel 10, spasi 1 - Rapikan daftar Pustaka 	GJ	A.

NO	TANGGAL	KEGIATAN		PARAF	
		MASALAH	PENYELESAIAN	DOSEN	MHS
4.	26 / 2025 Mei	Pengumpulan review draft LTA	- Revisi penulisan sesuai panduan - Revisi tabel pengumpulan data	GJ	AB
5.	27 / 2025 Mei	Pengumpulan draft LTA	Ace BAB 1-5	GJ	AB

Lampiran 14. Lembar Bukti Perbaikan Seminar Hasil Tugas Akhir

**LEMBAR PERBAIKAN
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR**

Hari / Tanggal : Kamis, 09 Juni, 2011
 Nama Mahasiswa : Lia Maulani
 Judul Tugas Akhir : Penilaian Pemahaman Obat Antidiabetik pada
 Sennitelline Henci di Mataram Selatan, Dinas Kesehatan
 Komunitas Masyarakat Keluarga dan Pengembang Dalam Lata

HASIL MASUKAN :

Pengujian 1:
 Pertanyaan tentang 4x Validitas & Reliabilitas A lat. 3 / Jaw.
 Ans. 4x Validitas & Reliabilitas hasil survei hasil ; pada pertukaran
 Pertukaran penggunaan dan menggunakan bahan yang terdapat tripi
 terdiri dari dua bagian yang berfungsi dalam studi ini apa
 Mengidentifikasi faktor-faktor dalam penelitian ; Banyak tidak ada
 Rpp. 16 pasal.

Pengujian 2:
 Kertas hasil obat mana kategori ? obatnya apa ?
 → Pertanyaan ditulis pada paragraf

Pengujian 3:
 ✓ R. Lengkap. tulisan jelas dan (kalem yg cocok),
 Kepentingan hasil pengujian

✓ Rumur → pengujian diketahui apa ? Miskeluar
 Dalam pertukaran
 - tabel 4.7 → tambahan. Pada obat Mengeluh

Pengujian 1,

24/25
 16

Ismail, S.Tech., M.Si., Apt.

NIP. 19660919198103102

Pengujian 2:

96/25

Ayu. Mery Hartini, Pemergiat, M.Ked. Farm., S.Farm., M.Kesm., Apt.

S. Farm., M. Farm.

NIP. 19700909199103102

Pengujian 3,

25/25

NIP. 19850616200303102

Lampiran 15. Lembar Bukti Pengecekan Similarity

TURNITIN FIX.docx			
ORIGINALITY REPORT			
20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1 archive.org Internet Source		3%	
2 repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source		3%	
3 www.mhprofessional.com Internet Source		1%	
4 Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper		1%	
5 pdfcoffee.com Internet Source		1%	
6 ia601505.us.archive.org Internet Source		1%	
7 www.scribd.com Internet Source		1%	
8 docplayer.info Internet Source		1%	
9 123dok.com Internet Source		<1%	

**LEMBAR BUKTI PENGECEKAN SIMILARITY/PLAGIARISM
DENGAN TURNITIN**

Nama : Lia Maulani
NIM : 2248401056
Judul LTA : Gambaran Penggunaan Obat Analgesik pada Swamedikasi Nyeri di Masyarakat Desa Srim Galih Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus Tahun 2025
Prodi : D3 Farmasi

Telah melakukan pengecekan Turnitin sebagai berikut :

Ke-	Tanggal	Hasil (Nilai)	Paraf Pelugas Perpuslekoan dan Cap
1	13 / 06/24 Juli	30%	
2			
3			

Mengelakui,

Pembimbing 1



(Mukhdalina, S.Farm., M.Tech., MM)
NIP. 1983126 2009 04 1002

Pembimbing 2



(Agi, Agus, S.Tech., Teknologi Informasi, MM)
NIP. 19831012024 0801

Catatan : Pengisian kolom tanggal dan hasil ditulis tangan