

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran penggunaan obat pada pasien stroke di rawat inap Rumah Sakit Imanuel, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persentase berdasarkan karakteristik sosio-demografi:
  - a. Berdasarkan jenis kelamin, pasien laki-laki yang paling banyak menderita stroke yaitu sebanyak 58%.
  - b. Berdasarkan usia, pasien yang menderita stroke paling banyak pada usia 46-65 tahun, yaitu 58%.
  - c. Berdasarkan pekerjaan, pasien yang menderita stroke paling banyak IRT (Ibu Rumah Tangga) sebanyak 35%.
2. Persentase berdasarkan karakteristik:
  - a. Berdasarkan jenis stroke, stroke iskemik yang paling banyak diderita pasien yaitu 96 (96%) pasien.
  - b. Berdasarkan jarak kejadian pasien menderita stroke pertama dengan terakhir, paling banyak selama 1-3 tahun yaitu 34%.
  - c. Berdasarkan periode serangan stroke, paling banyak sebanyak 2 kali serangan yaitu 91%.
  - d. Berdasarkan riwayat penyakit, pasien yang menderita serangan stroke mempunyai riwayat penyakit hipertensi yaitu 79 (60%).
  - e. Berdasarkan obat yang digunakan, citicoline adalah obat yang paling banyak digunakan sebanyak 98 (12%).
  - f. Berdasarkan golongan obat, golongan obat antiplatelet yang paling banyak digunakan dalam pengobatan stroke yaitu sebanyak 130 (16%).
  - g. Berdasarkan bentuk sediaan, bentuk sediaan tablet yang paling digunakan dalam pengobatan yaitu sebesar 539 (64)%.
  - h. Berdasarkan rute pemberian, rute oral yang paling sering digunakan sebesar 605 (72%).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu:

### **1. Bagi peneliti selanjutnya:**

Diharapkan hasil penelitian selanjutnya ini dapat digunakan sebagai referensi, pendukung, pedoman, pembanding, dan juga diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat digunakan sebagai indikator dalam penelitian lanjutan, serta melakukan penelitian tentang bagaimana kepatuhan terhadap obat berdampak pada kejadian stroke berulang.

### **2. Bagi Rumah Sakit:**

Rumah sakit perlu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga terkait pentingnya kepatuhan minum obat, efek samping yang perlu diwaspadai, serta penggunaan obat jangka panjang pasca stroke, sehingga tidak akan ada stroke kembali di kemudian hari.