

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan karakteristik ibu dan status KEK Ibu hamil dengan kejadian stunting pada anak, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi riwayat KEK pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas pagelaran sebanyak 38,9%.
2. Distribusi frekuensi kejadian stunting di wilayah kerja puskesmas pagelaran sebanyak 27,4%.
3. Ada hubungan Antara kepada ibu hamil dengan kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas pagelaran dengan P-Value 0,001.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan

Lebih diperbanyak literatur mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil dan hubungan nya dengan kejadian stunting Sebagai acuan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi Tempat Penelitian

Lebih ditingkatkan program Konseling gizi, Khususnya Yang berkaitan dengan Peningkatan pengetahuan Dan kesadaran Ibu hamil tentang risiko Dan pencegahan KEK.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi lokasi maupun jumlah responden, serta lebih banyak Variabel yang diteliti yang berkaitan dengan stunting.