

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPURUNING JURUSAN
SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
Skripsi, 03 Mei 2025

Bela Ariyana

**Hubungan Paritas dan Usia dengan Tingkat Nyeri Kala I Fase Aktif Pada
Ibu Bersalin di PMB Nurhasanah, S.Tr.Keb Bandar Lampung**

xvi + 54 halaman, 8 tabel, 8 gambar dan 7 lampiran

ABSTRAK

Nyeri persalinan merupakan salah satu bentuk nyeri paling hebat yang dialami wanita, terutama pada kala I fase aktif. Tingkat nyeri yang dirasakan ibu bersalin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah paritas. Ibu primipara cenderung merasakan nyeri lebih berat dibandingkan multipara karena belum memiliki pengalaman sebelumnya. Sementara itu, usia juga diduga berpengaruh, namun belum diketahui kepastian hubungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara paritas dan usia dengan tingkat nyeri kala I fase aktif pada ibu bersalin di PMB Nurhasanah, S.Tr.Keb Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross-sectional*. Sampel berjumlah 79 orang ibu bersalin yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan skala nyeri *Numeric Rating Scale* (NRS), kemudian dianalisis menggunakan uji *Chi-Square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan tingkat nyeri kala I fase aktif ($p = 0,001$). Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat nyeri kala I fase aktif ($p = 0,454$).

Kesimpulan terdapat hubungan yang signifikan antara paritas dengan tingkat nyeri kala I fase aktif pada ibu bersalin. Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat nyeri kala I fase aktif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memberikan asuhan kebidanan khususnya pada ibu primipara.

Kata Kunci : Paritas, Usia, Tingkat Nyeri, Kala I, Persalinan, NRS
Daftar Bacaan : 21 (2015-2024)

HEALTH POLITECHNIC OF TANJUNGKARANG
DEPARTEMENT OF MIDWIFERY
Thesis, May 03 2025

Bela Ariyana

The Relationship Between Parity and Age with the Level of Pain During the Active Phase of the First Stage of Labor in Mothers Giving Birth at PMB Nurhasanah, S.Tr.Keb, Bandar Lampung

xvi + 54 pages, 8 tables, 8 figures, and 7 appendices

ABSTRACT

Labor pain is one of the most intense types of pain experienced by women, particularly during the active phase of the first stage of labor. The level of pain perceived by the mother can be influenced by various factors, one of which is parity. Primiparous women tend to experience more intense pain than multiparous women due to their lack of prior experience. Meanwhile, age is also suspected to have an influence, although its relationship remains unclear.

This study aimed to determine the relationship between parity and age with the pain level during the active phase of the first stage of labor among mothers giving birth at PMB Nurhasanah, S.Tr.Keb Bandar Lampung.

This research employed a quantitative approach with a cross-sectional design. A total of 79 laboring mothers were selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and the Numeric Rating Scale (NRS), and analyzed using the Chi-Square test.

The results showed a significant relationship between parity and the pain level during the active phase of the first stage of labor ($p = 0.001$). However, there was no significant relationship between age and the pain level ($p = 0.454$).

There is a significant relationship between parity and the pain level during the active phase of labor. However, no significant relationship was found between age and pain level. This study is expected to serve as a reference in providing midwifery care, especially for primiparous mothers.

Keywords : Parity, Age, Pain Level, First Stage, Labor, NRS

Reading List : 21 (2015-2024)