

Pengaruh terapi musik terhadap Baunding Attachment pada ibu Post Sectio Caesarea

by Al Murhan

Submission date: 20-Apr-2022 07:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 1814973810

File name: k_terhadap_Baunding_Attachment_pada_ibu_Post_Sectio_Caesarea.pdf (411.65K)

Word count: 2684

Character count: 16468

PENELITIAN

PENGARUH TERAPI MUSIK TERHADAP *BOUNDING ATTACHMENT* PADA IBU *POST SECTIO CAESAREA*

Adhaini Widiyawati*, Idawati Manurung*[◇], Al Murhan*

* Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang

[◇]Corresponding Author: idawatimanurung@yahoo.com

Nyeri *post sectio caesarea* akan mengganggu proses *bounding attachment* antara ibu dan bayi. Musik dapat menurunkan stres dan nyeri sehingga mempercepat *bounding attachment*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh terapi musik terhadap *bounding attachment* pada ibu *post sectio caesarea*. Desain penelitian ini dengan *quasy eksperimental non equivalent control group*. Populasi adalah ibu *post sectio caesarea* dengan jumlah sampel 60 responden. Analisis dengan *uji T test Independen*. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata *bounding attachment* pada kelompok intervensi dengan terapi musik adalah 113.97, sedangkan rata-rata *bounding attachment* pada kelompok kontrol (tanpa terapi musik) adalah 98.70. Hasil analisis menunjukkan hasil $p\text{-value} = 0,00$, maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan terapi musik terhadap *bounding attachment* pada ibu *post sectio caesarea*, dimana tingkat *bounding attachment* pada kelompok yang diberikan terapi musik lebih tinggi daripada ibu yang tidak diberikan terapi musik. Sarannya adalah sebaiknya program terapi musik ini bisa diberikan pada setiap ruangan perawatan post partum di setiap rumah sakit.

Kata kunci: *Bounding Attachment*, *Post Sectio Caesarea*, Terapi Musik

PENDAHULUAN

Terapi musik sebagai salah satu alternatif untuk menurunkan tingkat kecemasan dapat dilihat pada beberapa penelitian berikut ini yakni O'Brien (2002, dalam Ispriantari, 2015) mengungkapkan bahwa terapi musik dapat menurunkan kecemasan pada responden di bagian perawatan kanker di the Royal Melbourne Hospital. Pertamax, dalam Tri Yuli (2014) mengatakan bahwa terapi musik juga dapat memberikan efek fisiologis atau biologis pada seseorang, yaitu dengan stimulasi beberapa irama yang didengar. Musik dapat menurunkan kadar kortisol yaitu hormon stres yang dapat berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi, serta memperbaiki fungsi lapisan dalam pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah dapat meregang sebesar 30%.

Nurul Indah Sari (2018) juga menyebutkan terapi musik Ismail dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori *Gate Control*, bahwa impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan disepanjang system saraf pusat. Musik

Klasik juga dapat menurunkan tingkat kecemasan seseorang, Basri, dkk. (2018) menyebutkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terdapat kecemasan pasien pre operasi yang diberikan terapi musik klasik. diberikan terapi musik klasik. Terapi musik memiliki efek samping lebih kecil serta terapi musik memiliki keuntungan seperti biaya yang dikeluarkan tidak mahal dan lebih praktis (Marlina, 2017). Menurut penelitian Kemper dan Danhauer (2005), bahwa musik secara luas digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi stres, dan mengalihkan perhatian pasien dari gejala yang tidak menyenangkan, sehingga dengan demikian jelas bahwa terapi musik berpengaruh terhadap kondisi emosional seseorang (Permatasari, Misrawati & Hasanah, 2015). Menurut penelitian Rianto Handayani (2014) menyatakan bahwa ada pengaruh pemberian terapi musik terhadap nyeri pada pasien post operasi *sectio caesarea* (SC).

Wanita *sectio caesarea* mengalami nyeri akibat trauma operatif. Variabilitas individu nyeri pasca operasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sensitivitas

terhadap nyeri, faktor psikologis, usia, dan genetika. (Dewi Marfuah, dkk. 2019). *World Health Organization* (WHO) tahun 2015 memperkirakan bahwa sekitar 18,5 juta kelahiran *section caesarea* dilakukan setiap tahunnya diseluruh dunia. Hasil Riskedass tahun 2018 menunjukkan kelahiran dengan metode operasi *sectio caesarea* sebesar 17,6% dari total 74.736 kelahiran. Angka persalinan *sectio caesarea* di Provinsi Lampung tahun 2018 sekitar 13,2% dari 2644 kelahiran. Angka kejadian *sectio caesarea* di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 adalah 3,991 dari 169.000 persalinan (2,36%) dari seluruh persalinan. Berdasarkan hasil data rekam medis medis, angka persalinan *sectio caesarea* pada bulan Maret-April 2020 mencapai 83 orang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Bunda Lampung.

Pawatte, dkk. (2013) membuktikan ibu yang bersalin dengan metode *sectio caesarea* memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang bersalin spontan. Rasa nyeri meningkat pada hari pertama post operasi *sectio caesarea*. Secara psikologis tindakan *sectio caesarea* berdampak terhadap rasa takut dan cemas terhadap nyeri yang dirasakan setelah analgetik hilang. Kecemasan dan nyeri pada post *sectio caesarea* saling mempengaruhi. Rasa cemas yang berkelanjutan dapat menyebabkan stres, post partum blues bahkan psikosis yang menyebabkan ibu tidak dapat menjalankan perannya sebagai ibu bagi bayinya (Fadilah, Megawati & Astriyani, 2018). Nyeri post *sectio caesarea* tentunya juga mengganggu berlangsungnya laktasi sehingga akan berakibat berkurangnya nutrisi pada bayi, dan berkurangnya *bounding attachment* antara ibu dan bayi (Alexander et al, 2010 dalam Kuswandari, 2016).

Berdasarkan penelitian oleh Yodotama, Hardiani & Sulistyorini (2015) terkait gambaran *bounding attachment* pada ibu post partum dengan *sectio caesarea* di RSIA Srikandi IBI Kabupaten Jember lebih banyak yang memiliki *bounding attachment* tidak baik sebesar 52,3%.

Dalam penerapan terapi musik banyak dikembangkan jenis-jenis musik. Salah satunya yaitu musik pop yang bertema ibu, anak dan kasih sayang. Musik yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Musik yang digunakan merupakan musik kompilasi lagu-lagu yang bertema ibu dan anak dan kasih sayang. Memberikan suatu gambaran bahwa betapa besarnya kasih sayang seorang ibu walaupun kadang ada yang harus dia korbakan asalkan anaknya bahagia (Levi, dkk. 2017). Hal tersebut dapat membantu ibu post *sectio caesarea* untuk membangun *bounding attachment* antara ibu dan bayi.

METODE

31
Penelitian ini menggunakan pendekatan *quasy experiment* dengan rancangan *non equivalent control grup*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien post *sectio caesarea* primig⁴⁷rida post 8 jam operasi. Sample pada penelitian ini adalah pasien post *sectio caesarea* primigravida post 8 jam operasi yang berjumlah 60 responden yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Analisa bivariat menggunakan uji *T test Independen*.

HASIL

Gambaran Responden Penelitian

18
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa umur responden paling banyak pada kelompok intervensi yaitu berada pada tahap dewasa awal (26-35 tahun) dengan jumlah 18 orang dan sebanyak 12 orang berada pada tahap remaja akhir (16-25 tahun). Pada kelompok control responden 18 ing banyak yaitu berada pada tahap dewasa awal (26-35 tahun) dengan jumlah 18 orang dan sebanyak 12 orang berada pada tahap remaja akhir (16-25 tahun). Pada

kelompok intervensi responden paling banyak berpendidikan SMA/SMK dengan jumlah responden 13 orang, SMP berjumlah 9 orang, diploma III 4 orang, S1 26 jumlah 2 orang dan SD berjumlah 2 orang, sedangkan pada kelompok kontrol responden paling banyak berpendidikan SMA/SMK sebanyak 20 orang, diploma III sebanyak 5 orang, SMP berjumlah 3 orang dan S1 berjumlah 2 orang. 27 Responden pada kelompok intervensi paling banyak adalah sebagai ibu rumah tangga 43 sebanyak 18 orang, karyawan swasta ada 7 orang, PNS ada 3 orang dan pedagang 27a 2 orang, pada kelompok kontrol paling banyak bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 16 orang, karyawan swasta berjumlah 9 orang, pedagang 4 orang dan PNS ada 1 orang.

33 Analisis Univariat

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Rata-Rata 42
Bouding Attachment Pada
Kelompok Intervensi dan
Kelompok Kontrol

Kelompok	n	Mean	SD	Med	Max	Min
Intervensi						
Pre	30	98.57	2.609	98.00	104	93
Post	30	113.97	3.837	114.00	120	106
Kontrol						
Pre	30	98.33	3.546	98.00	92	106
Post	30	98.70	3.354	98.50	94	106

Hasil penelitian didapatkan hasil 50 nilai rata-rata *bouding attachment* pada kelompok intervensi sebelum diberikan terapi musik 98.57 dengan standar deviasi 2.609. Pada hasil pe 24 aian rata-rata *bouding attachment* setelah diberikan terapi musik adalah 113.97 dengan standar deviasi 3.837. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil *p value* (0.000) < 0.05 artinya terdapat perbedaan *bouding attachment* sebelum dan setelah diberikan terapi musik.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil penilaian rata-rata *bouding attachment* sebelum pada kelompok kontrol yaitu 98.33 dengan standar deviasi 3.546. Pada penilaian rata-

rata *bouding attachment* sesudah pada kelompok kontrol yaitu 98.70 dengan standar deviasi 3.354. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui *p value* (0.014) < 0.05, artinya terdapat perbedaan *bouding attachment* sebelum dan setelah pada kelompok kontrol.

Analisis Bivariat

46
Tabel 2: Distribusi Perbedaan Rata-Rata
Bouding Attachment Pada
Kelompok Intervensi dan
Kelompok Kontrol

Bouding attachment	n	Mean	Std. Deviation	<i>p value</i>
Intervensi	30	113.97	3.837	0.000
Kontrol	30	98.70	3.354	

Hasil penelitian ini diperoleh hasil rata-rata pada kelompok intervensi adalah 113.97 sedangkan pada kelompok kontrol diketahui bahwa hasil selisih rata-rata yaitu 98.70 dan hasil 33 isih rata-rata nilai *bouding attachment* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol adalah 15.27 yang artinya ada per 40 laan rata-rata nilai *bouding attachment* pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hasil uji statistik me 10 gunakan uji *T test Independent* didapatkan hasil *p value* (0.000) < α (0.05), maka dengan ini Ha diterima yang artinya ada pengaruh signifikan terapi musik terhadap *bouding attachment* pada ibu post *sectio caesarea*.

PEMBAHASAN

48
Perbedaan skor rata-rata *bouding attachment* pada kelompok intervensi disebabkan karena pemberian terapi musik yang bertema kasih sayang antara orang tua dan anak dimana lirik-lirik lagu yang berikan berisi tentang kasih sayang, pengorbanan dan rasa terima kasih dari seorang anak kepada ibu dan ayahnya yang dapat menimbulkan perasaan haru bagi yang mendengarkan. Hal ini dapat

membantu ibu membangun *bounding attachment* yang baik dengan bayi. 3

Hal ini sejalan dengan teori musik dapat memberikan rangsang pada sistem saraf simpatis dan parasimpatis untuk menghasilkan respon relaksasi. Karakteristik respons relaksasi yang akan ditimbulkan berupa penurunan frekuensi 3 di, keadaan relaksasi otot, dan tidur. Efek musik pada sistem neuroendokrin adalah memelihara keseimbangan tubuh melalui sekresi hormone-hormon oleh zat kimia ke dalam darah, seperti ekskresi endorphin yang berupa dalam menurunkan nyeri, mengurangi pengeluaran katekolamin dan kadar 7 kortikosteroid adrenal (Toner, 2010). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suryani Manurung dkk (2011) bahwa terapi musik dapat mencegah terjadinya postpartum blues pada ibu postpartum karena musik memengaruhi sistem limbik di otak yang menekan fungsi poros hipotalamus, hipofisis dan kelenjar adrenal sehingga menghambat pengeluaran hormon stres (epinefrin, norepinefrin, dopa, kortikosteroid). Selain itu musik juga dapat meningkatkan fungsi keke30 an tubuh. Rangsangan musik dapat meningkatkan pelepasan endorphin. Pelepasan tersebut memberikan suatu pengalihan perhatian dari rasa sakit dan mengurangi kecemasan (Tetti dan Cecep, 2015).

Pada kelompok kontrol peningkatan rata-rata skor *bounding attachment* disebabkan karena dilakukannya prosedur standar rumah sakit untuk membangun *bounding attachment* pada ibu dan bayi yaitu IMD (inisiasi menyusui dini) dan kontak fisik antara ibu dan bayi pada awal-awal kelahiran segera setelah ibu sudah pulih dari kondisi pasca operasi. Dengan melakukan IMD (inisiasi menyusui dini) dan kontak fisik tersebut ibu dan bayi dapat membentuk proses *bounding attachment* secara alamiah dan dibantu oleh keluarga. Menurut Elisabeth dan Endang (2015) dengan dilakukannya pemberian ASI secara eksklusif segera setelah lahir, secara langsung bayi akan mengalami kontak kulit dengan ibunya

yang menjadikan ibu merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia. Hasil analisa diatas sejalan dengan Klaus, Kenel dalam Wahyuni (2018) yang menyatakan kontak dini merupakan suatu yang penting bagi orang tua dan anak untuk membangun suatu pola hubungan namun sampai saat ini belum ada penelitian yang mampu membuktikan, diketahui bahwa kotak dini memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu fisiologis, dapat meningkatkan kadar oksitosin dan prolaktin, merangsang reflek hisap sejak dini, akan munculnya kekebalan aktif, dan dapat mempercepat bonding atau ikatan batin antara orangtua dan anak.

Karakteristik responden yang paling banyak berusia 26-35 tahun sehingga responden sudah memiliki emosi yang stabil dalam menerima perubahan baru dalam hidupnya sebagai orang tua, responden paling banyak berpendidikan SMA/SMK yang memiliki kematangan intelektual, dan responden paling banyak adalah seorang ibu rumah tangga yang siap menerima anaknya dan merupakan tugas utamanya mendukung dalam kesiapan ibu menjalani peran baru dan membangun *bounding attachment* yang baik. Kondisi pasca operasi yang mengalami perubahan fisik maupun psikologi seperti nyeri, kelelahan, perubahan hormonal dan cemas dapat diintervensi dengan terapi musik yang menyenangkan karena respon rileks dan tenang yang ditimbulkan dapat membantu ibu membangun *bounding attachment* yang baik dengan bayinya.

Procelli dalam Manurung dkk (2011) bahwa ibu postpartum menyusui mengalami penurunan kecemasan dan perubahan perilaku terhadap bayinya selama menyusui secara bermakna dibandingkan dengan ibu postpartum menyusui yang tidak diterapi musik. Kondisi ibu yang demikian dapat mendukung terjadi *bounding attachment* yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ike dkk (2015) dengan judul "Efektifitas Terapi

Musik Klasik Mozart Terhadap Penurunan Gejala Post Partum Blues". Hasil uji statistik yang didapatkan yaitu p value 0,000 ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi musik klasik Mozart efektif terhadap penurunan gejala post partum blues. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Manurung dkk (2011) dengan judul "Efektivitas Terapi Musik Terhadap Pencegahan Postpartum Blues Pada Ibu Primipara Di Ruang Kebidanan Rsup Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat.. Pada ibu yang diberi terapi musik terjadi penurunan skor kejadian postpartum blues sebesar 1,80. Ibu yang tidak diberi terapi musik memiliki peluang untuk mengalami postpartum blues sebesar 5,60 kali dibanding dengan ibu yang diberi terapi musik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian terapi musik sangat efektif dalam pencegahan postpartum blues.

26 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan hasil yang didapatkan tidak bertentangan dengan teori dan teori sebelumnya dan peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terapi musik terhadap *bounding attachment* pada ibu post *sectio caesarea*. Berdasarkan penelitian ini intervensi terapi musik dapat dimasukkan dalam standar operasional prosedur dalam membangun *bounding attachment* ibu dan bayi dengan alat musik yang lebih memadai untuk diberikan kepada ibu post partum dalam satu ruangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, D. L. L. (2018). Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Kecemasan Pasien Pre Operasi Di Instalasi Bedah Pusat RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018. *Jurnal Keperawatan Priority*, Vol 2, No. 13
- Dian Taviyanda, Budi Wahyuni, N. (2017). *Adaptasi Psikologis Pada Ibu Post Partum Primigravida Sectio Caesarea Dan Partus Normal Di Ruang Sarah (Kandungan Dan Kebidanan) Rumah Sakit Baptis Kediri*. [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/), 1–2. 35
- Elisabeth & Endang. (2015). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 25
- Fadilah, WN, Megawati, M. & Astiriyani, E. (2018). Pengaruh Hipnosis Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Post Sectio Caesarea. *Buletin Media Informasi Kesehatan*. 14(2): 150-155. 28
- Handayani, R. (2014). *Pengaruh Pemberian Terapi Musik Terhadap Nyeri Pasien Post Operasi Seksio Sesarea (Sc) Di Rumah Sakit Eka Bsd*. Skripsi. Universitas Esa Unggul. 17
- Ispriantari, A. (2015). Pengaruh Terapi Musik Klasik terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Remaja Putra (13-15 Tahun) yang Dirawat Inap. *Jurnal Kesehatan*, 03(3) 32–11.
- Kementrian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. 21
- Kuswandari, R.P. (2016). *Pengaruh Dzikir Untuk Mengurangi Skala Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesarea (SC)*. Yogyakarta. Skripsi, UMY.
- Levi Zahardi, J. L. T. (2017). Analisis Lagu Bunda Ciptaan Melly Goeslaw *E-Jurnal Sendratasik*, 6(1), 1–7. 41
- Manurung, S., Lestari, T. R., Suryati, B., Adwiyana, B., & Karma, A. (2011). Efektivitas Terapi Musik Terhadap Pencegahan Postpartum Blues Pada Ibu Primipara Di Ruang Kebidanan RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, (47), 17–23. 16

- 11 Marfuah, D., Nurhayati, N., Mutiar, A.,
11 miati, M., & Mardiani, R. (2019).
Pain Intensity among Women with
Post-Caesarean Sectio: A Descriptive
Study. *KnE Life Sciences*, 2019,
657–663.
<https://doi.org/10.18502/cls.v4i13.5322>
- Marli 45 Fitriya L.K. (2017). *Perbedaan
Penurunan Tingkat Nyeri Pada Ibu
Nifas Pasca Operasi Sectio
Caesarea Yang 52 Mendapatkan
Asuhan Nifas Normal Pasca Operasi
Sectio Caesarea Dengan Terapi
Musik Kesukaan Dan Tanpa Terapi
Musik Kesukaan*. Skripsi. UGM.
- Pawatte I dkk (2013). Perbedaan Tingkat
Kecemasan Pada Ibu Pre Seksio
Caesarea di RSIA Kasih Ibu dan
RSUP. Prof.Dr. R. D. Kandou
Manado. Manado. *Jurnal*
- 14 Kedokteran dan Tropik: Volume 1
- Permatasari, I. D., Misrawati, & Hasanah,
O. (2015). Efektifitas Terapi Musik
Klasik Mozart Terhadap Penurunan
Gejala Post Partum Blues. *Jom*, 2(2),
1160–1168.
- Sari, NI. (2018). Efektifitas Terapi Musik
Islami Terhadap Penurunan
Intensitas Nyeri Pada Ibu Post Sectio
Caesarea di RSUD Puri Husada
Tembilahan. *Jurnal Kesehatan
Husda Gemilang*. 1(2).
- 29 Solehati, T. & Cecep, E. (2015). *Konsep
dan Aplikasi Relaksasi Dalam
Keperawatan Maternitas*. Bandung:
Refika Aditama
- 20 Wahyuni, S. (2018). *Pengaruh Pijat Bayi
Terhadap Bounding Attachment di
Ruang Dahlia Rumah Sakit Daerah
Dr. Soebandi Jember*. Skripsi.
Universitas Jember.
- 9 Yodatama, D. C., Hardiani, R. S., &
Sulistiyorini, L. (2015). Hubungan
Bonding Attachment dengan Resiko
Terjadinya Postpartum Blues pada
Ibu Post partum dengan Sectio
Caesaria di Rumah Sakit Ibu dan
Anak(RSIA) Srikandi IBI
Kabupaten Jember. *E-Jurnal Pustaka
Kesehatan*, 3(2), 327–333.

Pengaruh terapi musik terhadap Baunding Attachment pada ibu Post Sectio Caesarea

ORIGINALITY REPORT

40%
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

34%
PUBLICATIONS

20%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Wilda Nurul Fadilah, Meti Megawati, Endang Astiriyani. "PENGARUH HIPNOSIS TERHADAP TINGKAT KECEMASAN IBU POST SECTIO CAESAREA", Media Informasi, 2018
Publication | 3% |
| 2 | Submitted to Universitas Nasional
Student Paper | 2% |
| 3 | Submitted to Universitas Jember
Student Paper | 2% |
| 4 | Nita Evrianasari, Nova Yosaria. "PENGARUH TEKNIK RELAKSASI GENGAM JARI TERHADAP NYERI POSTSECTIO CAESAREA", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2019
Publication | 2% |
| 5 | Hartono Hartono, Dayat Trihadi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Di RSUD Banyumas", Adi Husada Nursing Journal, 2021
Publication | 2% |

6	Peni Puspitasari, Herdis Herdiansyah. "Landslide Vulnerability in Residential Areas for Disaster Mitigation in Sawangan District, Depok City", Journal of Physics: Conference Series, 2019 Publication	2 %
7	Keumalahayati Keumalahayati, Supriyanti Supriyanti. "Pengaruh Terapi Musik Klasik Beethoven untuk Mengurangi Kecemasan pada Ibu Bersalin Pre Operasi Sectio Caesar", JKEP, 2018 Publication	1 %
8	Puti Rania Yulastari, Feni Betriana, Imelda Rahmayunia Kartika. "Terapi Musik Untuk Pasien Hipertensi : A Literatur Review", Real in Nursing Journal, 2019 Publication	1 %
9	Submitted to University of Glamorgan Student Paper	1 %
10	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1 %
11	Mahdiyeh Taheri, Leila Amiri-Farahani, Shima Haghani, Maryam Shokrpour, Asie Shojaii. "The effect of olive cream on pain and healing of caesarean section wounds: a randomised	1 %

controlled clinical trial", Journal of Wound
Care, 2022

Publication

12

Marlita Dewi Lestari, Kusuma Wijaya Ridi
Putra, Dimyati Dimyati. "LEVEL OF ANXIETY OF
PREGNANT MOTHER IN FACING SECTIO
CAESAREA OPERATIONS IN DKT SIDOARJO
HOSPITAL", Nurse and Health: Jurnal
Keperawatan, 2019

Publication

1 %

13

Juwati Prasetyaningsih, Ayu Pratiwi.
"Spirizomacare Terhadap Tingkat Kecemasan
Pada Pasien Pre Operasi Mayor", Adi Husada
Nursing Journal, 2022

Publication

1 %

14

Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium

Student Paper

1 %

15

Submitted to Liberty University

Student Paper

1 %

16

Kristina Maharani, Choirul Anwar, Agus
Suwandono. "Kombinasi Herbal Steam Bath
dan Massage Terapi pada Ibu Nifas dalam
Mencegah Post Partum Blues", Jurnal
Keperawatan Silampari, 2019

Publication

1 %

17

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

1 %

18

Emulyani Emulyani, Herlambang. "Pengaruh Terapi Zikir Terhadap Penurunan Tanda Dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Halusinasi", HEALTH CARE : JURNAL KESEHATAN, 2020

Publication

1 %

19

Egidius Umbu Ndeti. "THE TRADITIONAL MUSIC SAPE' THERAPY ON POST OPERATING PAIN SCALE REDUCTION AT SANTO VINCENTIUS HOSPITAL SINGKAWANG CITY", Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education, 2020

Publication

1 %

20

Submitted to fpptijateng

Student Paper

1 %

21

Jesslyn Khoirunnisaa Jayanthi, Dian Hudiawati. "Therapy to improve sleep quality in ICU patients", Jurnal Berita Ilmu Keperawatan, 2019

Publication

1 %

22

Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus

Student Paper

1 %

23

Puji Astutik, Eka Kurlinawati. "Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea", STRADA JURNAL ILMIAH KESEHATAN, 2017

Publication

1 %

24

Viktoriana Trivoni Parung, Shinta Novelia, Anni Suciawati. "PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK TERHADAP KECEMASAN IBU BERSALIN KALA I FASE LATEN DI PUSKESMAS RONGGAKOE MANGGARAI TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020", Asian Research of Midwifery Basic Science Journal, 2020

Publication

1 %

25

Aditya Dedy Nugraha. "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam", IJIP : Indonesian Journal of Islamic Psychology, 2020

Publication

1 %

26

Anggit Kartikasari, Soeharyo Hadisaputro, Sri Sumarni. "PENGARUH PRENATAL YOGA TERHADAP LAMANYA PERSALINAN KALA I KONTRAKSI UTERUS DAN PERUBAHAN KADAR HORMON ENDORPHIN PADA IBU PRIMIGRAVIDA STUDI KASUS DI PUSKESMAS KADUGEDE KUNINGAN JAWA BARAT", Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal, 2020

Publication

1 %

27

Bintang Siti Fadilah, Suparman Suparman, Mira Mutiyani, Dadang Rosmana, Priska Natasya. "Konseling Diet Rendah Kolesterol Dan Tinggi Serat Terhadap Pengetahuan Dan

1 %

Kadar Kolesterol Pada Penderita
Hiperkolesterolemia", Jurnal Riset Kesehatan
Poltekkes Depkes Bandung, 2019

Publication

28

Desmawati Desmawati, Agustina Agustina.
"Efektifitas Program Pendidikan Kesehatan
Terhadap Durasi Persalinan Pada Ibu Bersalin
Spontan", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat,
2019

Publication

1 %

29

Lukmanulhakim Lukmanulhakim, Desti
Agustina. "Yoga Pernapasan (Pranayama)
Terhadap Kecemasan Keluarga Pasien Kritis
Di Ruang ICU", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu
Kesehatan, 2018

Publication

1 %

30

Bayu saputra, Yani Sofiani, Diana Irawati. "The
effect bibliotherapy on depression and
anxiety level of breast cancer patient at Arifin
Achmad Regional General Hospital of Riau
Province", Jurnal Kesehatan Komunitas, 2019

Publication

1 %

31

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

1 %

32

Viora Rezky Harahap, Refi Ikhtiari, Chrismis
Novalinda Ginting, Martinus Ahmad Raif.
"Potential Protective Effects of Balakka Fruit
Extract (*Phyllanthus emblica* L.) Against

1 %

Doxorubicin-Induced Pancreatic Toxicity in Rats", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2020

Publication

33

Riandi Alfin, Busjra Busjra, Rohman Azzam. "Pengaruh Puasa Ramadhan terhadap Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe II", Journal of Telenursing (JOTING), 2019

Publication

<1 %

34

Anggrayeni Purba, Anggorowati Anggorowati, Untung Sujianto, Muflihatul Muniroh. "Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea Melalui Teknik Relaksasi Benson dan Natural Sounds Berbasis Audio Visual", Jurnal Keperawatan Silampari, 2021

Publication

<1 %

35

Jihan Francisca Raj, Yetty Dwi Fara, Ade Tyas Mayasari, Abdullah Abdullah. "Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif", Wellness And Healthy Magazine, 2020

Publication

<1 %

36

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

37

Ika Subekti Wulandari. "The Effects of Thermomechanical VICO to The Level of Pain during Vaccination", Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada, 2019

Publication

<1 %

38

Kgs M. Faizal, Kartini Eka Putri. "Pengaruh Dukungan Spiritual Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Di Ruang Bedah RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka", Malahayati Nursing Journal, 2021

Publication

<1 %

39

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Student Paper

<1 %

40

Yessi Fadriyanti, Zulharmaswita Zulharmaswita, Yosi Suryarinilsih, Heppi Sasmita, Defiaroza Defiaroza. "Pelatihan Caring terhadap Perilaku Memberikan Asuhan Keperawatan pada Mahasiswa", Jurnal Keperawatan Silampari, 2020

Publication

<1 %

41

Hilmah Noviandry Rahman. "Factor Analysis of Postpartum Blues on Post Partum Patients at Puskesmas Proppo Pamekasan", JOURNAL FOR QUALITY IN PUBLIC HEALTH, 2018

Publication

<1 %

42

Tasman Tasman, Heppi Sasmita, Yessi Fadriyanti, N. Rachmadanur, Lola Felnanda Amri. "Peningkatan Self Efficacy Remaja Berisiko Menggunakan Terapi Psikoedukasi dengan Musik", Jurnal Keperawatan Silampari, 2020

Publication

<1 %

43 Azmi Musyaffa Fadhilah, M Iwan Wahyuddin, Deny Hidayatullah. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perokok Beralih ke Produk Alternatif Tembakau (VAPE) menggunakan Metode K-Means Clustering", Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2020

<1 %

Publication

44 Dwi Susanti, Dwi Yati. "Gambaran kecemasan pada ibu postpartum sectio caesarea di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta", Riset Informasi Kesehatan, 2020

<1 %

Publication

45 Linda Sepriliani, Nunung Mulyani, Helmi Diana. "TERAPI MUSIK TRADISIONAL KECAPI SULING SUNDA MENGATASI TINGKAT NYERI IBU POST OPERASI SECTIO CAESAREA", Media Informasi, 2018

<1 %

Publication

46 Yenni Yenni, Reni Reni. "SECONDARY PREVENTION TERHADAP MOTIVASI KLIEN HIPERTENSI DALAM PENGONTROLAN TEKANAN DARAH", Real in Nursing Journal, 2018

<1 %

Publication

47 Andria Praghlapati. "Effect Of Progressive Muscle Relaxation Technique On Pain In Post

<1 %

48

Dahrizal Dahrizal, Gita Putri Dewi. "Belajar Melalui Video di Media Sosial Dapat Meningkatkan Keterampilan Pemasangan Kateter pada Mahasiswa Keperawatan", Journal of Telenursing (JOTING), 2019

Publication

49

Ni Putu Sumartini. "TERAPI MUSIK KLASIK MEMILIKI PENGARUH TERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK RETARDASI MENTAL DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PEMBINA MATARAM", Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram, 2020

Publication

50

Sitti Muhsinah. "Efektifitas terapi musik religi terhadap nyeri pada pasien fraktur", Health Information : Jurnal Penelitian, 2020

Publication

51

Tasbihul Anwar, Anwar Wardi Warongan, Fitriani Rayasari. "PENGARUH KINESIO TAPING TERHADAP TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST LAPARATOMI DI RUMAH SAKIT UMUM DR DARAJAT PRAWIRANEGARA, SERANG-BANTEN TAHUN 2019", Journal of Holistic Nursing Science, 2020

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

52

Agus Sarwo Prayogi, Yeyen Yuliana, Ana Ratnawati. "Pengaruh TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) terhadap intensitas nyeri pada pasien post operasi sectio caesarea", Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah, 2018

Publication

<1 %

53

Hijrianti Suharnah, Fatma Jama, Suhermi Suhermi. "Pengaruh Terapi Musik Klasik terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III", Window of Nursing Journal, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off