

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Studi Pustaka yang dilakukan pada 15 artikel jurnal didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Didapatkan kadar Fibrinogen pada pasien stroke iskemik berkisar antara 301.3 - 602.88 mg/dl.
2. Didapatkan kadar D-dimer pada pasien stroke iskemik berkisar antara $211 \pm 1099.65 - 118.71$ mg/dl

B. Saran

Berdasarkan hasil Studi Pustaka yang dilakukan pada 15 jurnal mengenai profil fibrinogen dan D-dimer pada pasien stroke iskemik disarankan untuk

1. Masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kadar fibrinogen dan D-dimer darah dengan rutin pada setiap kasus stroke iskemik
2. Kadar fibrinogen dan D-dimer yang tinggi dari nilai normal sebaiknya diturunkan kadarnya agar tidak terjadi stroke iskemik akut.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai peranan kadar fibrinogen dan D-dimer pada stroke iskemik dengan menyingkirkan faktor-faktor pengaruh yang belum dapat ditemukan pada penelitian ini serta dapat melakukan pemeriksaan parameter hemostasis (koagulasi) lainnya seperti PT, APTT, pada pasien stroke iskemik .