

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil studi pustaka yang dilakukan pada 15 artikel mengenai pengaruh pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) terhadap kadar hemoglobin dan jumlah trombosit pada pasien tuberkulosis (TB) paru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran kadar hemoglobin setelah pengobatan rata-rata berkisar antara 9,74 g/dl sampai 15,5 g/dl pada pasien TB paru yang mendapat terapi OAT.
2. Gambaran jumlah trombosit setelah pengobatan rata-rata berkisar antara 165.000/ $\mu$ l sampai 341.941/ $\mu$ l pada pasien TB paru yang mendapat terapi OAT.
3. Ada pengaruh pemberian OAT terhadap kadar hemoglobin pada pasien TB paru.
4. Ada pengaruh pemberian OAT terhadap jumlah trombosit pada pasien TB paru.

#### **B. Saran**

Dari hasil studi pustaka mengenai pengaruh pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) terhadap kadar hemoglobin dan jumlah trombosit pada pasien tuberkulosis (TB) paru disarankan bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan validasi dan menggunakan artikel terbaru dalam jumlah lebih banyak.